

Statistische Beiträge zur Remissionsfrage
bei der Fieberbehandlung
der progressiven Paralyse.

INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität zu Bonn.

Vorgelegt am 1. Dezember 1936

von

Hans Josef Luy

Assistenzarzt der Chirurgischen Abteilung
des Herz Jesu-Krankenhauses

in Trier.

Bonn 1937

Anton Brand

Gedruckt mit Genehmigung der Med. Fakultät der Univerf. Bonn.

Referent: Prof. Dr. P o h l i s c h.



Die erst seit gut anderthalb Jahrzehnten in die Klinik eingeführte Fieberbehandlung der progressiven Paralyse hat in dieser relativ kurzen Zeit zu einer in allen Teilen der Welt unglaublich regen Publizistik und jetzt kaum noch überschaubaren Zahl von kasuistischen Beiträgen, Mitteilungen von Forschungsergebnissen wichtiger Einzelfragen, umfangreichen Monographien und dergleichen mehr geführt.

Durch die Erfolge der Malariatherapie wurde das Dogma von der Unheilbarkeit der Paralyse völlig erschüttert. Wenn man auch noch weit davon entfernt ist, bei der Paralyse von einer sicher heilbaren Krankheit zu sprechen, so hat die Fieberbehandlung bei dieser unheilvollsten aller Erkrankungen des Nervensystems zu bewunderswerten Erfolgen geführt und vor allem sehr fruchtbar auf die klinische Forschung gewirkt.

Bald nachdem Wagner-Jaureggs Veröffentlichungen über seine ersten Malaria-Impfungen vom Jahre 1917 erschienen waren, wurden seine Angaben auch von anderen Kliniken gewürdigt. So haben als erste Weygandt und Nonne im Hamburger großen Material, dann Weichbrodt und Jähnel in Frankfurt a. M. und Plaut und Steiner in München seit 1919 die Fieberbehandlung der Paralyse mit Malaria durchgeführt. Das Ausland kam, wie man dies aus der Literatur sehr deutlich verfolgen kann, erst allmählich nach. Die Malaria-Therapie wird in England erst seit 1924, in Rußland seit 1923, in Dänemark und in Italien seit 1924, in Australien seit 1928 ausgeübt.

Die anfangs allenthalben geäußerten Zweifel, Kritik und vorsichtige Zurückhaltung haben jetzt einer allgemeinen Übereinstimmung Platz gemacht. Nachdem man therapeutische Versuche angestellt hatte mit fiebererregenden Stoffen, die nicht von Mikroorganismen herrühren (Natrium nucleicum, Phlogetan Albumosen, Peptone, Milch) und solchen, die von Mikroorganismen stammen (Tuberculin, verschiedene Vaccinearten), fand man, daß doch

am wirksamsten das durch Infektion mit Mikroben erzeugte Fieber ist. Neben der Malaria tertiana wurde noch die Malaria quartana, Recurrens, Sodoku in Anwendung gebracht; doch bleiben diese Methoden der Malaria-Behandlung gegenüber weit im Hintergrund; lediglich die Recurrens-Behandlung hat sich noch einen gewissen Platz behaupten können. Vor allem bei der durch Rezidiv oder zur Komplettierung des Ergebnisses notwendigen Wiederholung der Kur oder bei sogenannten Versagern oder Steckenbleibern, d. h. Patienten, die auf die Malaria-Infektion nicht recht fiebern wollten, wird der Recurrens-Behandlung eine gute Wirkung nachgerühmt.

Die Vorzüge bzw. Nachteile der einzelnen Fiebererzeugungsmethoden im Vergleich zueinander soll in dieser Arbeit nicht genauer untersucht werden sondern soweit sie notwendig, nur kurz erwähnt werden. Vielmehr wollen wir versuchen, aus der mit Sorgfalt durchgesehenen Weltliteratur, soweit sie für die statistische Verwertung in Frage kam, die für die Beurteilung der Remissionsfrage wichtigen Faktoren mit statistischen Belegen zu versehen.

Ehe wir zum eigentlichen Thema kommen, müssen zwei Fragen noch behandelt werden, einmal Wert und Schwierigkeiten einer Statistik bei dem zur Diskussion stehenden Problem und zweitens die Beurteilung des Remissionsbegriffes.

Über die Bewertung der vielen Publikationen äußert sich K i h n, daß etwa ein Drittel wegen ihrer Ungenauigkeiten für eine statistische Bearbeitung nicht in Frage kommen. Derartige Ungenauigkeiten sind u. a. mangelnde oder fehlende Angaben über die Art des Beobachtungsgutes, d. h. ob es sich um initiale oder Spätfälle, Hand- oder Kopfarbeiter, ausgewählte oder nicht ausgesuchte Patienten handelt. Ferner vermißt man oft Angaben über die Dauer der Erkrankung, über spezifische Vor- und Nachbehandlung, über das Alter der Patienten und vor allem über Nachuntersuchungen bzw. Katamneseerhebungen. Auch spielt der Fehler der kleinen Zahl in der Statistik eine große Rolle. Ausdrücke wie „befriedigende“ oder „zufriedenstellende“ Remission sind natürlich äußerst ungenau. Die Beurteilung des Remissionsgrades ist überhaupt in

hohem Grade dem subjektiven Ermessen jedes einzelnen überlassen, so daß es wesentlich ist, ob ein Autor der Methode günstig oder ablehnend gegenübersteht. In früheren Angaben ist zum Teil von 60—70% Vollremissionen die Rede war, was sowohl auf zu enthusiastische Beurteilung und eine gewisse Kritiklosigkeit als aber auch auf die zu kleine Zahl und zu kurze Beobachtungszeit zurückführbar sein kann. Die Beurteilung nur nach sozialen Gesichtspunkten, d. h. ob der Erkrankte durch die Behandlung wieder seinem Berufe zugeführt wird, ist sehr ungenau. So kann einer z. B. nicht berufstätig sein, obschon er berufsfähig ist, weil er arbeitslos ist. Nach P o e n i t z ist die Wiedererlangung der Berufsfähigkeit in Arbeiterkreisen höher als in intellektuellen Kreisen.

Um diese subjektiven Fehlerquellen, die durch die Beurteilung eines einzigen Untersuchers gegeben sind, möglichst zu reduzieren, schlägt E l d r i d g e vor, diese durch eine viergliedrige ärztliche Kommission vornehmen zu lassen.

Die Beschaffenheit des Beobachtungsgutes ist bei der Beurteilung der Behandlungsergebnisse schon ziemlich früh und allgemein gewürdigt worden. Es ist ein zu offensichtlicher Unterschied zwischen Sprechstundenpatienten und langjährigen Anstaltsinsassen, zwischen Patienten einer Privatklinik und denen einer öffentlichen Anstalt, zwischen Patienten aus intellektuellen und sozial höherstehenden Kreisen und solchen aus Arbeiterkreisen. In einer Anstalt in ländlichen Gegenden sind andere Patienten untergebracht als in einer solchen in der Stadt.

Wichtig ist die genügend lange Erhebung der Katamnese. Noch nach längerer Zeit kann ein Aufstieg aus einer niedrigen Remissionsstufe in eine höhere erfolgen. Die Sicherheit der Einreihung in die verschiedenen Remissionsgrade nimmt mit der Dauer der Beobachtung zu. Dabei ist einmal die Auffassung von der Remission und andererseits die Einteilung ihrer verschiedenen Grade sehr unterschiedlich. Hiervon soll noch später die Rede sein.

Bei dem Vergleich von Statistiken verschiedener Autoren entstehen vor allem Fehlerquellen durch die Unterschiede in Zahl und Material, durch Mehrfachzählung desselben Patienten in verschiede-

nen Statistiken. Vergleicht man die Erfolge in den verschiedenen Ländern, so ist auch noch zu beobachten, daß hier große Unterschiede in der Erfahrung mit der Methode entsprechend ihrer zeitlich sehr verschiedenen Einführung bestehen, d. h. daß mit der längeren Erfahrung mit der Behandlungsmethode selbstverständlich auch meistens bessere Erfolge erzielt werden. Große Differenzen ergeben sich bei dem Vergleich der Resultate bei den nicht ausgewählten Patienten des einen Autors mit den nach prognostisch günstigen Gesichtspunkten ausgewählten des andern. So berichtet Gerstmann aus der Wiener Klinik bei ausgewählten Patienten von 73,7% Vollremissionen und 18,4% unvollkommenen Remissionen; die entsprechenden Zahlen waren für nicht ausgesuchte 33% und 35%. Bravetta hatte 31,5% gute Remissionen bei Nichtausgewählten und bei Auswahl 52%.

Bisher war nur die Rede vom Vergleich der Ergebnisse bei ein und derselben Methode. Will man verschiedene Methoden miteinander vergleichen, so kann man sich nach Wagner Jauregg nur ein sicheres Urteil bilden, wenn man die nach denselben Grundsätzen ausgewählten Kranken alternierend mit Malaria und den anderen Mitteln behandelt und die Erfolge nach denselben Gesichtspunkten und genügend lange überprüft. Diese sogenannte Simultanmethode bietet den Vorteil der Einheitlichkeit der Zeit, des Untersuchers, des Materials. Eine Beurteilung, ob und inwieweit die einzelnen Methoden einander gleichen oder differieren ist deswegen noch nicht möglich, da auffallenderweise in der Literatur über genügend lange fortgesetzte Beobachtungen nach der Simultanmethode noch wenige Angaben vorhanden sind.

Wenn man von Behandlungserfolgen bei der Fiebertherapie spricht, pflegt man diese als Remissionen zu bezeichnen, die man je nach der Güte in verschiedene Grade einteilen kann. Kraepelin versteht unter Remission Nachlaß der manifesten psychischen und physischen Krankheitserrscheinungen und nicht mehr. Nicht hierher zu rechnen ist das Abklingen eines akuten deliranten Zustandes, wie Gaupp ausführt. Er legt das entscheidende Gewicht auf die Besserung der Demenz. Ähnlich urteilen Tophoff und

Schröder, die ebenfalls bei Besserung der Demenz erst das Abklingen von Exacerbationen als Remission bezeichnen. Hoche dagegen erblickt schon in jeder Besserung, ja im Stillstand der progressiven Krankheit eine Remission.

Auch die sachgemäßeste und intensivste Therapie vermag nur eine wenn auch oft einer völligen Heilung ähnliche Besserung im psychischen und somatischen Befinden herbeizuführen; eine Heilung im absoluten Sinne ist dagegen nicht möglich. Selbst bei ganz beginnenden Krankheitsfällen erfolgt die Heilung meist nur mit Defekten. Dies muß gesagt werden, da von verschiedenen Seiten darauf aufmerksam gemacht wurde, daß die therapeutischen Vollremissionen gar keine seien, da noch Pupillenstarre und merkbare psychische Veränderungen bestünden. Binswanger ist der Ansicht, daß die Zerstörung der funktionstragenden Substanz viel früher beginnt als mit klinischen Untersuchungsmethoden nachgewiesen werden kann; daraus ergäbe sich bei allen therapeutischen Methoden nur ein beschränkter Heilwert. Auch Benedek findet bei den Vollremitierten noch leichte Störungen, Verminderung der Merkfähigkeit, Reizbarkeit und eine Herabsetzung der Initiative. Mauz bezeichnet diese Herabsetzung der momentanen Dispositionsfähigkeit, die Glättung der Persönlichkeit als Nivellierung. Es seien dies nicht organisch zelebrale Ausfallserscheinungen, keine Nervensymptome, sondern die ganz allmählich einsetzende Nivellierung der im Kern erhaltenen Persönlichkeit. Diese Nivellierung fällt jedoch nur dann ins Gewicht, wenn die menschlichen und beruflichen Anforderungen besonders hohe sind. Sie ist weder durch klinische Untersuchungsmethoden objektiv darstellbar, noch braucht sie in der sozialen Leistungsfähigkeit zum Ausdruck zu kommen.

Der praktische Gesichtspunkt der wiedererlangten Arbeitsfähigkeit ist nach Kirschbaum, Jossman, Gerftmann, Kihnu. a. kein genauer Maßstab zur Beurteilung einer Remission. Auch die klinisch-psychiatrische Untersuchung kann oft im Stiche lassen. In der Praxis stellen sich gerade in der Beurteilung der Demenz vor und nach der Behandlung fast unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen; das soziale Verhalten ist nicht zu verwerten,

da es dem Grad der Demenz nicht parallel geht. Ein wichtiges Kriterium der Remission ist nach Gerstmann die Krankheitseinsicht. Die bloße klinische Untersuchung genügt heute nicht mehr zur Beurteilung der psychischen Fähigkeiten der durch die Malaria gebesserten oder „geheilten“ Paralytiker. Claude und Masquin fordern ein Testschema, nach dem alle Patienten gleichmäßig beurteilt werden können; vor allem solle auch die „prä-morbide Persönlichkeit“ beurteilt werden. Hierzu bemerkt Gerstmann, daß es trotz aller Sorgfalt doch subjektivem Ermessen unterliegen könne, ob ein Paralytiker auf Grund eines Examens als berufsfähig erachtet wird; wenn er aber berufstätig sei, so sei dies eine absolut objektive Feststellung. Hierzu haben wir bereits bemerkt, daß mancher Berufsfähige nicht auch berufstätig sein kann, da Arbeitslosigkeit oder andere sozialpolitische Gründe ihn von der Arbeit abhalten. Das richtige wird sein, wenn man unter Würdigung der psychiatrischen Untersuchungsergebnisse, die durch humorale Befunde fundiert sein müssen und unter richtiger Einschätzung der sozialen Wertigkeit, d. h. des Erfolges und der Brauchbarkeit im Leben, sein Urteil über die Remission abgibt.

Bei der geschilderten Schwierigkeit der objektiven Beurteilung einer Remission stieß die Einteilung der durch die Fieberbehandlung erzielten Remissionsgrade natürlich auf noch größere Hemmungen.

Die erste Einteilung stammt von Kirshbaum und Weygandt. Sie umfaßt fünf Stufen. In die erste Gruppe (I) kommen diejenigen, die wieder voll berufstätig sind und fast keine abnormen Symptome zeigen. In der Gruppe II sind die Berufstätigen mit geringen psychischen Defekten. I und II faßt er als gute Remissionen zusammen. In der Gruppe III sind diejenigen, die psychisch geschwächt unter Aufsicht arbeitsfähig sind bei einfacher Anstaltsbeschäftigung oder im eigenen Haushalt; diese Gruppe wird auch als „geringe Remission“ bezeichnet. Unter IV sind die unveränderten und bei V die nicht beeinflussten, progressiven und gestorbenen Fälle. Diese etwas vielfältige Gliederung scheint uns eine Fehlerquelle in sich zu bergen. Gruppe IV und V würden wir zusam-

menfassen, da nichtbeeinflusste, unveränderte Fälle im Sinne des Krankheitsbegriffes stets progredient sind. Auch lehnen wir eine Einteilung nach rein sozialen Gesichtspunkten, wie K a s p e r e k sie vornimmt, ab. K a s p e r e k teilt ein in I Vollberufsfähige und II bedingt Berufsfähige = Gruppe der sozial Brauchbaren. III möglicherweise Stationärgewordene, in häuslichem Milieu Haltbare und Tätige = Gruppe der sozial Indifferenten. IV unverändert Progrediente, V Gestorbene. IV und V = Gruppe der sozial Unbrauchbaren.

Mit G e r s t m a n n und J o s s m a n n sind wir der Ansicht, daß die Einteilung der Remissionen in zwei Gruppen, bzw. der gesamten Ergebnisse in vier Gruppen völlig ausreicht und halten das Schema von J o s s m a n n bei Kenntnis der Einteilungsversuche der anderen Autoren für das beste. Nach J o s s m a n n gehört in Gruppe I die Vollremission, d. h. eine Remission mit völligem Rückgang der Krankheitsercheinungen oder nur mit dem geringsten erst bei genauer psychiatrischer Prüfung feststellbaren residuären Zeichen der ehemaligen psychischen Störung und mit voller, durch Tätigkeit erprobter Wiedererlangung der früheren Berufstätigkeit; in Gruppe II die unvollkommene Remission, d. h. eine deutliche Besserung mit mehr oder minder groben Defekten, in Beruf oder in weniger verantwortlicher Stellung tätig; in Gruppe III die Versager, das sind Stationäre, Progrediente; in Gruppe IV die im Zusammenhang oder später Gestorbenen. Unter Versager rechnen wir auch die stationär gewordenen Fälle, die insofern einen Scheinerfolg darstellen, als die an sich fortschreitende Krankheit für eine gewisse Zeit in ihrer Progredienz aufgehalten wird. Im Endresultat stellen diese stationär gewordenen Paralytiker keinen Gewinn sondern eine enorme soziale Belastung dar, da nur eine Verlängerung einer wertlosen Existenz ohne Wiedererlangung einer individuellen oder sozialen Wertigkeit erzielt wird.

Solange man sich nicht auf ein allen Untersuchungen gleichmäßig zugrunde liegendes Schema gereinigt hat, ein Defiderat, das für die vorliegende Frage ebenso notwendig wie schwer realisierbar sein dürfte, ist die Reduzierung der Ergebnisgruppen gleichbedeu-

tend mit einer Vereinfachung und Prägnanz der vergleichenden Übersichten (J o s s m a n n).

Die Voraussetzung für die Beurteilung der Wirksamkeit der Fieberbehandlung ist, wie T o p h o f f, K i r s c h b a u m u. a. ausgeführt haben, neben der Erforschung der klinischen Erscheinungen vor, während und nach der Behandlung die Kenntnis der Häufigkeit der Spontanremissionen. Die statistischen Angaben über die Spontanremission differieren sehr stark. Bei den älteren Angaben dürfte wohl die Diagnosestellung und der Begriff der Remission nicht immer ganz klar gewesen sein. In den letzten Jahrzehnten sollen die Spontanremissionen eine geringe Steigerung erfahren haben (B e h r, P i l c z, J o a c h i m).

Tabelle I.

Acker	1888	14,3 %
Berg	1891	18,4 %
Behr	1900	4 %
Matthey	1901	7,1 %
Jahrmärker	1901	14,8 %
Mohr	1902	19 %
Gaupp	1903	10 %
Pilcz	1908	21 %
Joachim	1912	4 %
Kirschbaum	1923	11,4 %
Tophoff	1924	19,7 %
Mittelwert		<u>13,07 %</u>

H o p p e (1901) fand bei Männern 16,8% und bei Frauen 14,1% Spontanremissionen. Die gleichen Zahlen bei D ü b e l (1916) sind 13,5% für Männer bzw. 6,5% für Frauen.

Was die Häufigkeit der Remissionen nach Fieberbehandlung im Vergleich zu den Spontanremissionen betrifft, so genügt ein Blick auf Tabelle II um den großen Unterschied in der Zahl zu demonstrieren.

Tabelle II.

Autor	Spontan Rem.	Malaria Rem.
Kasperek	6,7 %	23 %
Gonzalez	3,85 %	31,9 %
Wiesel	17,5 %	56 %
Kirchbaum	11,4 %	46,8 %

Was nun die Dauerhaftigkeit der Spontanremissionen anbelangt, so wird nach Kirchbaum gewöhnlich nur für ein halbes bis ein Jahr, in Ausnahmefällen für 3—4 Jahre Arbeitsfähigkeit erreicht. Nach Wiesel halten Spontanremissionen in 63% nur ein Jahr, in vereinzelt Fällen 4—5 Jahre. Kraepelin stellt fest, daß Paralytiker, die länger als 2—3 Jahre gesund bleiben, vereinzelt Ausnahmen sind. Bei der Malaria-Remission jedoch bildet dies eine ausgesprochene Häufigkeit. Auch in der Tiefe der Remissionen bestehen große Unterschiede. Während auch gute Spontan-Remissionen frühzeitig rezidivieren, zeigen die Remissionen nach Fieberbehandlung die Tendenz zur Dauerhaftigkeit. Bei der Spontanremission hat die Paralyse nichts von ihrem progredienten Charakter eingebüßt, sie ist nur vorübergehend gleichmäßiger geworden. Nach Gerstmann ist die ausgesprochene Abhängigkeit der Spontanremission von akuten und perakuten Krankheitszuständen (Exacerbationen im Sinne Schröders) bei der Malarieremission nicht zu beobachten. Diese ist an keine bestimmte Verlaufsart und keine bestimmten Krankheitsperioden gebunden mit Ausnahme der galoppierenden Form. Selbst bei der ichtisch verlaufenden dementen Form kommt es zur weitgehenden Besserung und Arbeitsfähigkeit, wie später noch gezeigt werden soll.

Es bestehen demnach zwischen Spontanremissionen und Remissionen nach Fieberbehandlung weitgehende quantitative und qualitative Unterschiede. Malarieremissionen stellen sich in einem Prozentfuß ein, der die bei Spontanremissionen angegebenen Zahlenwerte um ein Mehrfaches übersteigt. Sie weisen ferner in einer großen Reihe von Fällen, nicht allein in klinisch-psychiatrischer,

fondern auch neurologischer und ierologischer Hinsicht eine Vollkommenheit und Tiefe auf, wie sie bei Spontanremissionen in der Regel vermißt werden oder höchstens ganz vereinzelt auftreten. Schließlich zeigen therapeutische Remissionen ausgesprochene Neigung zur Stabilität. Auf Grund dieser Tatsachen erkannten K i r s c h b a u m und W e y g a n d t schon früh, daß man die Prozentzahl der Spontanremissionen nicht als „Auswahlkorrektur“ abzuziehen braucht, wie dies von manchen Seiten anfangs gefordert wurde.

Vor der Malariaära betrug die durchschnittliche Lebenserwartung eines Paralytikers nach M e n d e l 3—4 Jahre, nach W o l l e n b e r g 2—3 Jahre, nach B u m k e 2 Jahre 5 Monate. K r a f t - E b i n g sagt, daß zwei Drittel das zweite Krankheitsjahr nicht überleben. A s k g a a r d stellt die Mortalität vor der Malaria-behandlung und nach dieser gegenüber:

	im 1. Jahr	im 2. Jahr	im 3. Jahr
vor	40—60%	62—75%	72—85%
nach	6%	15%	33%

N o b b e gibt die Mortalitätsziffer innerhalb von vier Jahren nach der Einlieferung der Paralytiker in die Anstalt mit 85% ohne Behandlung und 20% nach Malariabehandlung an. Nach Y o r k e sind seit Juli 1922 in fünf englischen Anstalten 23,4% der Paralytiker entlassen worden, während vor der Malariazeit hier noch keiner entlassen werden konnte. Auch die erfolglose Malariabehandlung verlängert das Leben beträchtlich. Doch tritt nach W a g n e r - J a u r e g g deshalb keine Stauung, vielmehr eine Abnahme in den Anstalten ein, weil ein großer Teil der in den Kliniken Behandelten nicht in die Anstalt, sondern nach Hause kommt. Von den Nichtgeheilten spricht allerdings P o e n i t z als von einem sozialen Problem. Während früher nach 2—3 Jahren der Tod die Erlösung brachte, vegetieren die „erfolglos“ Behandelten (vgl. D a t t n e r) noch jahrelang herum und bedeuten eine erhebliche soziale Belastung. Diese soll nach N o b b e in 50% bei allen Malariabehandelten vorliegen. S c h n e i d e r ist ebenso zurückhaltend und spricht

von einer jetzt aufgetauchten „chronischen Paralyse“. Trotzdem verlangt S a g e l die Fieberbehandlung bei allen Paralytikern; bei entsprechendem Ausbau der Außenfürsorge könnten Defektgeheilte und Stationäre ausnahmslos in Hauspflege entlassen worden.

Solange es eine Fieberbehandlung der Paralyse gibt, hat man immer wieder nach Anhaltspunkten für die prognostische Beurteilbarkeit der Remissionen getrachtet. Übereinstimmend hat man sehr bald eine deutliche Abhängigkeit von dem Stadium und der Dauer der Erkrankung erkannt. Schon 1887 stellte W a g n e r - J a u r e g g fest: „Wenn ein Geisteskranker in dem ersten Halbjahr des Bestehens seiner Geisteskrankheit von einer der genannten Erkrankungen (Erysipel, Typhus und andere) befallen wird, ist die Wahrscheinlichkeit eine sehr große, daß er dadurch von seiner Psychose geheilt wird. Hat die Krankheit länger als zwei Jahre gedauert, übt der Infekt eine weniger günstige Wirkung aus.“

Die Frage der Krankheitsdauer ist schwierig zu entscheiden. Aus dem psychischen Bilde ist es schwer, den zeitlichen Beginn zu erkennen. Desgleichen ist die anamnestiche Klärung dieser Fragen sehr schwer. Nimmt man das erste Auftreten gut faßbarer Symptome, zum Beispiel megalomane Ideen, unsinnige Handlungen, paralytische Anfälle, so dürfte das für viele Fälle nicht dem wirklichen Beginn entsprechen. H a a s erwähnt, daß manchmal tabische Symptome der Paralyse um Jahre vorausgehen können. Was wir im klinischen Bilde als initiale Psychose erkennen, ist im biologisch-morphologischen Sinne meist der Folgezustand eines lange Zeit unerkannt vor sich gehenden Prozesses, der mit H o c h e zu sprechen, „Jahrelang, vielleicht jahrzehntelang kleinste Posten addieren mußte“, bis die ersten Ausfallerscheinungen zutage traten. J o s s m a n n betont, daß die Dauer des Prozesses nicht ohne weiteres identisch ist dem Tempo seines Ablaufs. Da man annehmen muß, daß es während der Remission zu einer Wiedererlangung der Funktion des geschädigten Nervensystems kommt, läßt sich folgern, daß Remissionen in einem Zeitpunkte zustande kommen müssen, in dem der destruierende Prozeß noch nicht sehr fortgeschritten und noch nicht tiefgreifend ist, — also im Beginn des Leidens. Nach

Pfeifer und von Rhoden ist für jede Remissionsgruppe eine bestimmte Krankheitsdauer typisch. Vollremissionen treten ein vor Ablauf eines Vierteljahres nach Manifestwerden der Erkrankung. Die Heilungsaussichten sind noch relativ günstig bis zu einem Jahr Krankheitsdauer, bei längerer Dauer seien höchstens Defektheilungen zu erwarten. Bei mehr als zweijähriger Dauer käme die Behandlung meist zu spät. Diese Angaben sind, wie die Ergebnisse der großen Kliniken zeigen, zu eng gefaßt. Gerstmann findet bei andauernder Vollremission eine Krankheitsdauer zwischen wenigen Monaten und drei Jahren, bei unvollkommener Remission höheren Grades eine Dauer von $\frac{1}{2}$ bis über $3\frac{1}{2}$ Jahren; unvollkommene Remission niederen Grades und unbeeinflusste haben meistens eine lange Dauer bis zu sechs Jahren und mehr.

Folgende Tabelle möge diese Angaben erläutern:

Tabelle III.

Autor	Remissionen	Krankheitsdauer
Kirby und Bunker	dauernde Vollrem.	16 Monate
	unbeeinflusste	27 Monate
Levin	68 % gute Rem.	weniger als 4 Monate
	35 % „ „	mehr als 1 Jahr
Olavide	60 % Rem.	bis 6 Monate
	40—45 % Rem.	mehr als 6 Monate
Somogyi	80 % Heilung bzw. Besserung	bis 3 Monate
	53 % „	bis 6 Monate
	14,5 % „	bis 1 Jahr
Nicol	60 % Rem.	bis 6 Monate
	26 % „	bis 1 Jahr
Pasqualini	34 % Vollrem.	2—12 Monate
	29,5 % gute Rem.	
	13,6 % unverändert	
	32,7 % +	

Pasqualini	29,4 %	Vollrem.	
	14,7 %	gute Rem.	
	29,4 %	unverändert	1—2 Jahre
	26,4 %	+	

Sehr instruktiv sind auch Gegenüberstellungen von Behandlungserfolgen an Patienten aus Nervenkliniken und Irrenanstalten; bei der einen Gruppe handelt es sich um Frühfälle, bei den anderen oft um langjährige Anstaltsinsassen (vgl. Tab. IV).

Tabelle IV.

Zit. nach Weeber:

Irrenanstalt Weeber		Nervenlinik Zingerle
Weitgehende Besserung	15 %	51 %
Besserung	28 %	42 %
unverändert	20 %	5 %
gestorben	37 %	2 %

Zit. nach Heinrich:

Irrenanstalt Wittenau		Nervenlinik Wiefengrund
Vollrem.	24,2 %	26 %
Gute Rem.	7,7 %	24 %
	<u>32 %</u>	<u>50 %</u>

Was nun die Inkubationszeit der progressiven Paralyse bzw. ihre Latenzzeit anbetrifft, so haben Meggendorfer und Baender eine Abnahme der Latenzzeit bei zunehmendem Lebensalter gefunden. Der Gesamtdurchschnitt der Inkubationszeit beträgt nach Baender 16,6, nach Meggendorfer 15,1 Jahre. Nach Baenders Erfahrung an den Gruppenschnitt-ten von drei Jahresklassen ergaben sich höhere Werte der guten Remissionen bei kurzen Latenzzeiten, höhere Werte der schlechten Remissionen bei langen Inkubationszeiten.

Ein recht bemerkenswertes Ergebnis hatte Jossmanns Unterfuchung über die Verteilung der Remissionsgruppen bei Patien-

ten, die eine spezifisch antiluetische Vorbehandlung hinter sich hatten und solche, die nicht vorbehandelt waren. Das Ergebnis ist folgendes:

Tabelle V.

Gruppen	I	II	III	IV
Vorbehandelt	26,3%	18,3%	25,7%	29,7%
Nicht vorbehandelt	20,0%	16,2%	26,3%	37,5%

Demnach ist der Prozentsatz der besser Remittierten unter den spezifisch Vorbehandelten größer. In der Gruppe der im Zusammenhang oder später Gestorbenen (IV) überwiegen die Unbehandelten. J o s s m a n n erblickt in seinem Ergebnis eine günstige Wirkung der spezifischen Vorbehandlung. G e r a t o w i c h dagegen behauptet, daß vorausgegangene antiluetische Vorbehandlung ohne Einfluß auf den Remissionsgrad sei. Es sind über diese Fragen nur wenige Angaben in der Literatur zu finden und diese sind ähnlich widersprechend wie die zitierten.

Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Alter der Patienten und Remission wurde unterschiedlich beantwortet. Dies hing zunächst damit zusammen, daß die Technik der Infektionstherapie sich allmählich vervollkommnete und ältere Patienten, die wegen der Gefährlichkeit der Behandlung anfangs ausgeschaltet wurden, nun auch in die Fieberbehandlung einbezogen wurden. P l e h n lehnte Patienten über 60 Jahre zur Malariatherapie ab. T h u r z o verspricht sich bei Paralytikern über 50 Jahren kein Resultat. Nach W a g n e r - J a u r e g g s Erfahrungen ist jedoch hohes Alter bis zu 70 Jahren keine Kontraindikation. C a l d w e l l sah Vollremissionen bei Patienten über 60 Jahren, desgleichen K i r s c h b a u m. J o s s m a n n berichtet über 65 Patienten im Alter über 60 Jahren; er erzielte bei 7,7% sehr gute und bei 21,5% einfache Remissionen. Der Satz von B a r b e a u, daß das Lebensalter zur Zeit der Malariabehandlung der Remissionsgruppe umgekehrt proportional sei, stimmt nur mit einem gewissen Vorbehalt. Es hat sich nämlich gezeigt, daß zwischen 20 und 30 Jahren die Ergebnisse nicht so gut sind, wie zwischen 30 und 40 Jahren.

Balogh, Ranschburg, Marie, Jossmann fanden die besten Resultate bei Patienten zwischen 30 und 40 Jahren. Nach Caldwell beträgt das durchschnittliche Lebensalter bei guten Remissionen 37 Jahre, bei mittelmäßigen 46 Jahre.

Baenders Aufstellung über Alter der Patienten und die erzielten Resultate sei in Tabelle 6 wiedergegeben.

Tabelle VI.

Alter	Remissionen	Alter	Remissionen
25—30	8,3 %	45—50	30,2 %
30—35	50 %	50—55	26,7 %
35—40	46,7 %	55—60	10 %
40—45	41 %		

Nach Gerftmann dürfte mit zunehmendem Alter die Abwehr und Widerstandskraft gegenüber dem paralytischen Krankheitsprozeß in einer Art abnehmen, daß eine Wiederaktivierung derselben auch unter dem Einfluß der Infektionsbehandlung nicht mehr in entsprechender Weise oder nur unvollkommen erfolgen kann.

Auch mit der Frage, ob das Geschlecht bei der Remissionsfrage eine Rolle spiele, haben sich eine Reihe Autoren beschäftigt. Es ist die allgemeine Ansicht, daß Frauen weniger Vollremissionen bekommen als Männer, und daß bei ihnen die weniger guten Remissionen überwiegen (Schulze, Bunker, Jossman).

Wenn man berücksichtigt, daß bei Männern ein strengerer Maßstab in der Beurteilung angelegt wird aus sozialen und beruflichen Gründen als bei den mehr in der Familie tätigen Frauen, dürfte das Ergebnis für Männer noch relativ günstiger sein.

Tabelle VII.

Autor	Männer	Frauen	Remission
Sabatzky	44 %	28 %	Vollrem.
Levin	53 %	36 %	Remiss.
Warner	42,7 %	34,3 %	Remiss.
Mittelwert	46,58 %	32,76 %	

Tabelle VIII.

Autor	Gefchlecht	I	II	III	IV
Baender	Männer	14,6%	21,7%	13,7%	50,0%
	Frauen	5 %	30 %	26,7%	38,3%
Jossmann	Männer	23,4%	17,3%	25,8%	33,5%
	Frauen	19,5%	21,8%	28,7%	30,0%

Frauen kommen meist erst später in Behandlung als Männer, bei denen die Krankheit in verantwortlichen Berufen meist zeitig bemerkt wird. S a b a t z k y findet in seinem Material eine Krankheitsdauer von 28,3 Monaten für Frauen und 17,4 Monaten für Männer. Auch scheint die Malaria-Therapie bei Frauen weniger wirksam zu sein als bei Männern. Es scheint, daß eine Gravidität vor der luetischen Infektion die Frauen der Fieberbehandlung zugänglicher machte (Warner, Hinfie). Überhaupt reagieren Frauen, welche geboren haben, besser als Nullipare. Nach Caldwell ist die Remissionsaussicht bei Gravidgewefenen doppelt so groß. Er fand, daß von den in seiner Anstalt insgesamt aufgenommenen Frauen 28% Nullipare, 22% Primipare und 50% Multipare waren. Der Remissionsdurchschnitt bei der ersten Gruppe betrug 31%, bei der zweiten 47,6% bei der dritten 30%. Bei der Sanierung des Liquors und Blutes reagieren Frauen im allgemeinen schlechter als Männer; hier spielt für die Frauen eine durchgemachte Gravidität keine Rolle.

Wenn man sich die Patienten hinsichtlich ihrer Körperbautypen ansieht, so findet man allgemein ein besseres Reagieren der Pykniker auf die Fiebertherapie, bei denen das manische und expansive Bild überwiegt, während die Schizoiden mit ihren depressiven, dementen, agitierten und katatonen Zustandsbildern häufiger schlechtere Remissionen zeigen und eher zu Rezidiven neigen (Omaru, Nyirö, Pfeifer und von Rhoden, Schulz, Géza, Softakovich). O l a v i d e findet bei Pyknikern 60%, bei Leptofomatikern 20% Remissionen.

Auch dem Körpergewicht wird von manchen Autoren Bedeutung beigemessen. Nicol, Schulze, Kirby halten überein-

stimmend Gewichtsabnahmen nach der Fieberkur für ein prognostisch ungünstiges Zeichen, Zunahme dagegen für günstig. Kirby mißt bei der Prognosestellung zunächst der klinischen Form, dann dem Verhalten des Körpergewichts und endlich der Dauer der Erkrankung die größte Bedeutung zu. Die Gewichtszunahme ist jedoch nicht unbedingt ein günstiges Zeichen, sie zeigt eine Umstimmung des ganzen Organismus, ähnlich wie bei der Proteinkörpertherapie. Auch wird nach der Kur das im Fieber Verlorengegangene wieder ersetzt. Bei den Ungeheilten sah Kirby in 50% Gewichtszunahmen, bei den Vollremittierten in 95%.

Das Blutbild, die Blutfärbung und die Blutgruppen wurden ebenfalls hinsichtlich ihres Verhaltens bei der Remission untersucht, Olavide, Omaru u. a. fanden jedoch keine nennenswerten Beziehungen. Nach Sudo sollen die besten Remissionen bei Blutgruppe A vorkommen. Gerzanits fand bei Gruppe A in 74%, bei Gruppe B in 60,3%, bei Gruppe O in 54,5% und Gruppe AB in 40% Remissionen.

Bei der Betrachtung der verschiedenen Formen der Paralyse ergaben sich gewisse Unterschiede bezüglich der Häufigkeit und der Grade der Remission. Die Einteilung nach verschiedenen Zustandsbildern ist in vielen Varianten durchgeführt worden.

In allen Einteilungen kehren jedoch folgende Gruppen immer wieder: Die einfach dementen, die expansiven, die depressiven Formen. Bezüglich der dementen Form sind die Ausichten über die Remissionsausichten sehr verschieden. Die einen haben ungünstige Erfolge bei dieser Form (Westphal, Nicol), die andern haben auch hier gute Erfolge erzielt (Gerstmann, Sagel, Benedek, Bostroem). Barbeau teilt sogar einen extrem günstigen Behandlungserfolg mit; er will 66% Vollremissionen bei einfach Dementen erzielt haben. Hinfie berichtet, daß unter seinen katamnästisch beobachteten Fällen von den f.Zt. unter den einfach Dementen als gebessert gebuchten im Laufe der Zeit noch eine Reihe in die Gruppe der Vollremittierten aufgestiegen ist. Bostroem erklärt die Tatsache, daß auch die Demenz z. T. reparierbar ist, folgendermaßen: Er glaubt, daß in manchen Krankheits-

stadien Defekte offenbar dadurch vorgetäuscht werden, daß die Kranken der Möglichkeit, ihre Fähigkeiten anzuwenden, vorübergehend beraubt waren. Da wir nun nicht in der Lage waren, solche scheinbaren Defekte von Dauerausfällen zu unterscheiden, braucht uns auch eine erhebliche Demenz von einem Behandlungsversuch nicht abzuschrecken. Wenn bei der depressiven Form in der Literatur eine ungünstige Prognose gestellt wird, so glaubt Nyriö den Grund darin zu sehen, daß viele Beobachter aus Unsicherheit in der Terminologie oft paranoide Zustände als depressive bezeichnet haben.

In folgenden beiden Tabellen seien die diesbezüglichen Ergebnisse einiger Autoren zusammengestellt:

Tabelle IX.

Autor	gute Remission	mäßige Rem.	schlechte Rem.
Rodriguez	expansive depressive	—	—
Pfeiffer und von Rhoden	neurasthen. initiale, manische, depressive,	expansive, agitierte, euphor. demente	stumpf demente
Gerstmann	depressive, manisch- agitierte, einfach demente	demente	juvenile, galoppierende, senile
Blum	depressive expansive Anfallsparalysen	—	—
Kihn	manische, depressive, expansive,	—	—
Weygandt	expansive, demente, depressive	—	galoppierende infantile, juvenale.
Schulze	expansive, einfach demente	—	depressive

Tabelle X.

Autoren	einfach demente	expansive	manisch agitierte	depressive
Bunker Kirby	12% Voll.R.	50% Voll.R.	67% Voll.R.	—
Westphal	13,6% unvollk. R.	44,5% gute R.	—	33,3%
Barbeau	66% Voll.R.	49% Voll.R.	66% Voll.R.	—
Nicol	25% Voll.R.	—	25% Voll.R.	25% Voll.R.
Caldwell	—	50% Voll.R.	22% Voll.R.	
Lewin	45% Rem.	84% Rem.	33% Rem.	—

Bei der juvenilen Paralyse sind die Erfolgsaussichten im allgemeinen schlecht; sie ist glücklicherweise sehr selten; nach J o s s m a n n bekommen nur 1,5% der kongenital syphilitischen Kinder eine progressive Paralyse. Gegen früher, als E d e l s t e i n, D r i v e r, B r a n d e n b u r g, M e n n i n g e r u. a. über negative Erfolge berichteten, werden in den letzten Jahren auch bei der juvenilen Paralyse verhältnismäßig gute Erfolge erzielt (Benedek, Jossmann, Baumann, Herrmann, Nabarro, Westriemen, Larrivé). Die Prognose ist, wie Jossmann feststellt, zwar schlecht, aber nicht absolut ungünstig. L e e s erzielte bei 14 fieberbehandelten juvenilen Paralytischen in 21,4% Remissionen. Von J o s s m a n n s 42 Fällen remittierten in Gruppe I (vollkommen) 0%, in Gruppe II (unvollkommen) 21,4% in Gruppe III (unbeeinflusst) 62,2%, in Gruppe IV progredient und verstorben 16,4%. Heinze berichtet über 32 Fälle, wovon keiner eine Vollremission, eine Remission höheren Grades 3, eine Remission niederen Grades 6 erreichten, 9 unverändert und 8 chronisch progredient blieben.

Den neurologischen Begleitsymptomen haben die meisten nur geringe Bedeutung beigemessen, da man bald erkannte, daß auch ihre Besserung nach der Fieberbehandlung keine Prognose für den Remissionsgrad zuließ. Von den Symptomen waren am besten beeinflusbar die Dysarthrie, motorische Reizererscheinungen, Schrift; dagegen blieben Argyll-Robertson'sches und Westphal'sches Zeichen meist unbeeinflussbar.

„Narbensymptome“, d. h. Ausfälle, die auf eine irreversible Störung des anatomischen Substrats zu beziehen sind, sind nicht beeinflussfähig: Lichtreaktion, Sehnenreflexe, Ataxie, Blasenstörungen, Störung der Potenz. J o s s m a n n glaubt, daß gelegentliche Angaben über Wiederkehr der genannten Ausfälle auf Beobachtungsfehler und Mißdeutungen zurückzuführen seien.

P f e i f e r und v o n R h o d e n sahen Besserung der Sehnenreflexe häufiger bei spastischen als bei hypotonischen Symptomen; Besserung der Anisocorie beobachteten sie in 16 Fällen, Besserung der Lichtreaktion in 12 Fällen, doch sahen sie nie völlig lichtstarre Pupillen zu normalem Verhalten zurückkehren.

Wenn die Kliniker sich bemühten, die für den Erfolgsgrad der Fieberbehandlung maßgeblichen Faktoren zu finden, so war es naheliegend, zunächst auch die Beschaffenheit des Fiebers nach Höhe, Zahl und Art der Anfälle und Gesamtstunden in ihren Beziehungen zu den Remissionsgraden zu betrachten. Was die Höhe des Fiebers anbelangt, so glaubte man zunächst, daß diese ausschlaggebend sei. Auch heute sind die Amerikaner auf Grund ihrer Erfahrungen mit der Diathermiebehandlung dieser Ansicht (N e y m a n n und K ö n i g). Die Temperaturerhöhungen lassen sich in ihrer Bedeutung nicht genau abschätzen; sie stellten einen sehr wichtigen Indikator für die Vitalreaktionen des gesamten Organismus auf die Infektionskrankheiten dar und man kann nur ganz allgemein sagen, daß von dieser Reaktionsstärke der Heil-effekt abhängt. Es wurden aber auch von einigen Autoren (N o n e , W e y g a n d t , M ü h l e n s) gute Remissionen bei niedrigem Fieber beobachtet. In der überwiegenden Mehrzahl jedoch sind die Autoren sich darin einig, daß „bei gutem Reagieren“, d. h. bei solchen

Patienten, die während der Kur hohe und langdauernde Temperaturen erreichen, die besten Erfolge erzielt werden (Dattner). Nach Ranschburg kommt es auf die Zahl der kritischen Fieberstunden an; diese sei bei der Malariabehandlung viermal so groß wie bei den anderen Fiebermethoden.

Was nun den Zeitpunkt des Einsetzens der Remission anbetrifft, so hat man bei immer länger werdender Nachbeobachtung festgestellt, daß man mit der Prognosestellung unter diesem Gesichtswinkel sehr vorsichtig sein muß. Primär gebesserte oder unvollkommen Remittierte können noch im Laufe der Zeit zu weitgehender Remission aufrücken und Remittierte einer niedrigen Stufe eine höhere erreichen (Gerstmann, Somogyi). Möllenhoff beobachtete noch Eintritt von Vollremissionen nach Ablauf von zwei Jahren; doch glaubt er, daß früheres Einsetzen günstiger sei. Es ist bei der Festsetzung der Remissionseintritte zu berücksichtigen, wie außerordentlich schwer es ist, den Beginn sowie den Abschluß einer psychischen Besserung zu erkennen. Im allgemeinen läßt sich folgendes sagen: bei einer Reihe von Fällen, meist initialen, tritt die Remission bald nach beendeter Kur ein und schreitet schnell bis zu ihrem höchsten Grad fort; bei anderen, meist fortgeschrittenen Fällen tritt die Remission erst nach Ablauf von Wochen und Monaten ein und schreitet in kontinuierlicher Entwicklung zu dem jeweils erreichbaren Remissionsgrad fort. Es handelt sich hierbei um die bekannte Spätwirkung der Impfmalaria. Der früheste Zeitpunkt einer wahrnehmbaren Remission ist nach Sagel (Recurrans) der 28. Behandlungstag; im allgemeinen beobachtet er die ersten Anzeichen um den 55. Behandlungstag. Nach Baender, Schulze, Sudo treten die Remissionen 1—3 Monate nach abgeschlossener Behandlung ein, Mingazzini beobachtete erst nach fünf Monaten Erfolge, Vallejo nach sechs Monaten bis einem Jahr.

Claude und Masquin (zit. n. Dattner) haben in einer Zusammenstellung die Resultate unmittelbar nach der Behandlung mit den später ermittelten verglichen. Sie fanden in der ersten Gruppe 13,7% Voll-, 22,2% mäßige, insgesamt 35,9% Remissionen.

In der zweiten Gruppe 23,6% Voll-, 17,6% mäßige, insgesamt 41,1% Remissionen. Daraus kann man erkennen, daß einmal ein geringer Anstieg der Remissionen im Laufe der Zeit stattgefunden hat, dann was noch wichtiger ist, daß eine Verschiebung in dem Sinne eingetreten ist, daß niedriger Remittierte in die Gruppe der Vollremittierten aufgestiegen sind.

In ähnlichem Sinne verhält sich auch die serologische Assanierung. Wenn auch anfangs keine Parallele zwischen klinischer Besserung und Beeinflussung von Blut und Liquor einzutreten pflegt, so ist doch im Laufe der Zeit ein Abklingen der Blut- und Liquorreaktionen zu beobachten (Gerstmann, O'Leary).

Die Besserung steigt nach Ferraro und Fong von 15% nach sechs Monaten auf 85% nach 36 Monaten an (WaR, Globulinreaktion, Zellzahl). Man kann erst nach 36 Monaten von einem klinischen und serologischen Parallelismus sprechen. Ebenso äußern Pö nit z und Sch r a m m, daß erst nach langer Beobachtungszeit die serologische Besserung der klinischen parallel verlaufe. Demnach hat die Bewertung der serologischen Befunde unmittelbar im Anschluß an die Behandlung nur geringen Wert. Infolge des Mangels an zeitlicher Distanz war anfangs auch von maßgeblicher Seite behauptet worden, daß man die serologischen Befunde nicht zu hoch anzuschlagen brauche, wenn nur das klinische Bild gebessert sei; man hatte eben bei den unmittelbar nach der Behandlung vorgenommenen Untersuchungen zwar klinische aber keine serologische Besserung festgestellt. Dattner hält deshalb für zweckmäßig, jedes halbe Jahr zu punktieren, sogenannte „Liquorlängsschnitte“ anzulegen. Erst bei einem derartigen Vorgehen ist die Verlaufstendenz zu erkennen. Auch bei günstig Beeinflussten beansprucht die Rückbildung der humoralen Befunde zur Norm oft mehrere Jahre. Nach White dauert es im allgemeinen 2—3 Jahre bis zur völligen Liquorassanierung, in 6—7 Jahren sind die humoralen Befunde zu 100% gebessert, zu 50% vollkommen normal.

Dattner hatte bei einer über drei Jahren durchgeführten serologischen Untersuchungsreihe folgende Ergebnisse. Von 100 Fällen waren 1928 51,4% im Liquor negativ, 1929 65,5% und

1930 83,6%. Diese Zahlen demonstrieren deutlich die mit der Zeit zunehmende Konvergenz zwischen klinischer und serologischer Besserung. Nach Wagner-Jauregg kommt es im Laufe von 2—3 Jahren zur Besserung bis Negativwerden des Liquors oder die Besserung bleibt aus. Er und Leroy und Médakowitch, Dattner, Gerstmann u. a. sind der Ansicht, daß bei einem Negativbleiben bis zu drei Jahren eine Rezidivgefahr nicht mehr besteht. Nach Horn und Kauders ist die kritische Zeit in den ersten zwei Jahren nach der Kur zu sehen. Die rezidivbedrohten Fälle kennzeichnen sich durch eine sehr geringe Tendenz zur Besserung der Liquorreaktionen bzw. durch eine wiedereinfetzende Verschlechterung derselben auch dort, wo klinische Erscheinungen eines Rezidivs noch nicht nachweisbar sind. Auch hat sich herausgestellt, daß bei unverändert positivem humoralem Syndrom selbst die besten Remissionen von der Gefahr des Rezidivs bedroht sind.

Die Liquorassanierung wird beschleunigt durch spezifische Nachbehandlung. Diese Erkenntnis hat sich erst in den letzten Jahren allgemein durchgesetzt. Viele Autoren glaubten früher, in der Salvarfan-Nachbehandlung nur eine roborierende Wirkung erkennen zu können. Kirschbaum und Kaltenbach, Jossmann und Steenaerts fanden betreffs Tiefe und Zahl der Remissionen keinen Unterschied, ob spezifisch nachbehandelt war oder nicht, ebenso Schulze, Benedek, Nonne, Weygandt, Loberg. Vergleichende Serienuntersuchungen zeigen jedoch eindeutig ein Überwiegen der guten Remissionen bei den spezifisch Nachbehandelten. Nach Gerstmann betragen die Vollremissionen bei nicht Nachbehandelten 25%, bei Nachbehandelten 48,5%; eine Besserung ohne Rücksicht auf den eingetretenen Remissionsgrad bei Gruppe I in 40,6%, bei Gruppe II in 66,6%. Die Zahl der Todesfälle und der rasch Progredienten betrug bei I 18,7 und 22,0%, bei II 12 und 6,7%. Bemerkenswert ist bei Gerstmanns Fällen auch die verminderte Mortalität bei den spezifisch Nachbehandelten. — Eine Nachuntersuchung nach vier Jahren durch Dattner ergab bei den Nachbehandelten 51,5% Vollremissionen, bei Nichtnachbehandelten 34,3%. Auch hier kann

man die früher erwähnte Spätwirkung bzw. das Aufrücken der Remissionen im Laufe der Zeit erkennen. Targowla und Cénac, Westphal, Rodriguez und O'Leary fanden die besten Resultate bei nachfolgender Salvarfanbehandlung mit möglichst hohen Dosen, vor allem auch hinsichtlich der Dauerhaftigkeit der Remissionen. Nach Horn und Kauders bessern sich die humoralen Befunde zuverlässiger. Die Verteilung auf die einzelnen Remissionsgruppen ist bei den Nachbehandelten umgekehrt wie bei den Nichtnachbehandelten. Stoddart macht besonders auf die Besserung der Mortalitätsquote von 32 auf 6% aufmerksam.

Horn und Kauders weisen überzeugend nach, daß die kombinierte Behandlung einen deutlichen Vorsprung vor der einfachen Fieberbehandlung hat. Sie fanden folgende Werte bei kombinierter Fieber-Salvarfanbehandlung:

Neo-Salvarfan	Voll.-Rem.	LiquorØ	-beff.	positiv.
3,0 gr	34%	52%	19%	29%
5,0 gr	50%	59%	23%	18%

Horn und Kauders treten neben der spezifischen Nachbehandlung zwecks Rezidiv-Propylaxe auch für eine Wiederholung der Fieberkur mit einer anderen Methode bei Rezidivgefährdeten ein. Auch bei erfolglos mit einer Methode Behandelten bringt eine Wiederholung der Kur mit einer anderen Fiebermethode noch oft Erfolge. So fand Sagel, daß durch Recurrensbehandlung von Patienten, die mit Malaria erfolglos behandelt waren, noch in 47,6%, d. h. fast in der Hälfte der Verfägar lang dauernde und zum Teil sehr gute Remissionen erreicht wurden. So ist die Wiederholung der Kur geeignet, erstmalig erfolglos Behandelte doch noch zu bessern, bereits eingetretene Remissionen zu vertiefen, und Rezidivpropylaxe zu treiben. Nach der Ansicht der meisten Autoren ergänzen sich Malaria und Recurrens in gleicher Weise. Aber auch Pyriker ist nach vielseitigem Urteil zur Wiederholung einer Kur sehr geeignet.

Wenn ich nun im folgenden den Versuch machen will, die Ergebnisse der verschiedenen Behandlungsmethoden zum Vergleich

anzuführen, so sei nochmals auf die früher geschilderten Schwierigkeiten und Fehlerquellen eines derartigen statistischen Vergleichs hingewiesen.

Die Zahl der Mitteilungen über Behandlung mit Malaria ist ungeheuer groß, die über Recurrens bedeutend kleiner und über die anderen Methoden verschwindend gering. Zunächst möchte ich in der folgenden Tabelle die großen Sammelstatistiken, die ich in der Literatur fand, anführen und dann im Anhang die genauen Daten der Behandlungsergebnisse aus den Mitteilungen vieler Autoren für die Malaria und Recurrens-Behandlung anführen.

Tabelle XI.

Autor	Zahl der Fälle	Vollrem.	unvollk. Rem.
Vallejo	5000	29,6 %	25,3 %
Bunker	2460	27 %	26 %
Köhler	13802	29,9 %	21,8 %
Amabilino	15000	20—35 %	20—35 %
Bayley (englische Statistik)		35 %	30 %
Westphal (deutsche Statistik)		21,4 %	20 %

K r ä p e l i n nimmt als Durchschnittswert der guten Remissionen 30% an. D a t t n e r fand an Hand von drei großen Statistiken bei fortgeschrittenen Fällen 23,6—35%, bei initialen bis 46% Vollremissionen. Es sind dies die Zahlen, wie sie in jeder Zusammenstellung immer wieder erscheinen und offenbar das Optimum der durch Malariabehandlung zu erreichenden Heilerfolge darstellen.

Über die Erfolge mit der Recurrens-Fieberbehandlung der Paralyse äußert sich K i h n bereits 1927 folgendermaßen: „In der Gegenwart sind Malaria und Recurrens durchaus gleichberechtigt und werden je nach Geschmack und persönlicher Einstellung an den meisten Kliniken gebraucht.“ Überblickt man nun die bisher über die Recurrentherapie der progressiven Paralyse vorliegende Literatur, so erscheint es verwunderlich, welch relativ geringen Umfang in derselben angesichts der bereits 1919 in Angriff genommenen Be-

handlungsversuche das klinische Erfahrungsmaterial einnimmt. Es stellt daselbe vergleichsweise nur einen Bruchteil der im ganzen der Fieberbehandlung unterzogenen Patienten dar.

Die Faktoren, die für die Remission bestimmend sind, verhalten sich wie bei der Malaria. K i h n, M a r i e und M é d a k o w i t c h, H o r n, G e r s t m a n n erblicken in der Recurrensbehandlung eine wertvolle Ergänzung der Malariabehandlung, besonders bei Wiederimpfung oder bei Malariaverlagern, umgekehrt lassen sich Fälle, die durch Recurrens nicht beeinflusst wurden, zu einem großen Teil noch durch Malariaimpfung bessern.

Fleck sah nach Malaria 33%, nach Recurrens 34,2% sehr gute Remissionen. H o r n nennt für Malaria 42,2% und für Recurrens 18,2% Vollremissionen. Marie und Médakowitch haben 33% Remissionen bei Recurrensbehandlung. Große Erfahrungen sammelte S a g e l an einem ungünstigen Anstaltsmaterial. Er bekam 40,5% weitgehende Besserungen, 20,8% Besserungen, 4,5% blieben unbeeinflusst und 34,2% starben. Er glaubt, „daß es keine bessere Fürsprecherin für eine Methode gibt, wie ihre Bewährung an möglichst ungünstigem Material“. Ähnlich wie bei der Malaria wird auch bei Recurrens im Laufe der Zeit eine Zunahme der guten Remissionen durch Aufstieg aus niedrigeren Remissionsstufen beobachtet. 1925 berichtet G e r s t m a n n über 33 Patienten, die er wenigstens sechs Monate nach abgeschlossener Kur beobachtete; hiervon waren 18,2% Vollremissionen, 27,3% unvollkommene Remissionen, 45,4% blieben unbeeinflusst, 10% starben. Dieselben Patienten hat H o r n 1928 nach 2½ Jahren nachuntersucht und fand 24,3% Vollremissionen, 21,2% unvollkommene Remissionen, 33,3% unbeeinflusste und 21,3% verstorbene. Also auch hier wie überhaupt nach der Fieberbehandlung ein Aufrücken in den einzelnen Remissionsgruppen im Laufe der Jahre.

Über die Fieberbehandlung mit Pyrifur liegen nur relativ wenige Berichte mit guten Resultaten vor. J o s s m a n n und N o b b e glauben, daß die Pyrifurkur den anderen gleichwertig sei. Außerdem erscheine sie ungefährlicher und besser zu handhaben. Andere Autoren (Runge, Mulzer, Mandl, Sperling, Roggenbau,

Briener, Ruprecht) ziehen die Malariabehandlung der Pyriferkur vor. R u p r e c h t fand, daß die Remissionen nach Pyrifer weniger vollkommen, seltener und kürzer andauernd waren als nach Malaria. Es herrscht allgemein die Anschauung, daß Pyrifer niemals ein gleichwertiger Ersatz für Malaria sein kann. Es leistet jedoch vorzügliches, wenn man innerhalb seines Indikationsrahmens bleibt, so bei Patienten, für die eine Malariakur gefährlich wäre oder aber auch bei Wiederholung einer Kur. Hier steht es in gleichem Wettbewerb mit der Recurrens-Behandlung. Z i e g e l r o t h hat aus der Literatur 315 Fälle gesammelt, die mit Pyrifer behandelt wurden. Bei etwa 50% war eine Remission zu verzeichnen; im einzelnen fand er 22,8% Vollremissionen und 27% unvollkommene Remissionen; 27,2% unbeeinflusste und gestorbene; bei 17,7% blieb das Resultat fraglich.

Mit den Fiebermitteln Sodoku und Sulfofin haben sich nur eine kleine Anzahl von Autoren befaßt. K i h n hält die Resultate mit Sodoku nicht für schlecht. G r a b o w und K e y teilten 1929 mit, daß sie bei Anstaltspatienten ohne Auswahl 71,8% Remissionen nach Sodoku-Behandlung und 36,9% nach Malaria erzielten. Eine Bestätigung dieser reichlich hoch erscheinenden Zahl konnte ich sonst nirgends finden. N e y m a n n und K ö n i g berichten über 8% Vollremissionen und 22% Besserungen nach Sodoku. Über das Sulfofin äußern sich außer dem Erfinder S c h r ö d e r nur wenige Autoren günstig. So sah J o s s m a n n unter 45 Patienten, die er mit Sulfofin behandelte, 22,2% Vollremissionen, 26,7% Besserungen, 26,7% unbeeinflusste, 24,4% verschlechterte oder gestorbene. Er behauptet demnach, daß die Erfolge nicht schlechter seien als mit Malaria. Nachprüfungen von H e n d r i k s e n, L e v a d i t i, P i n a r d, P a t t e r s o n u. a. hatten dagegen wenig ermutigende Resultate. Nach ihrer Ansicht ist Sulfofin nur ein mangelhafter Ersatz für Malaria.

Neuerdings spielt die künstliche Temperatursteigerung mit elektrischem Verfahren, wie Diathermie und Kurzwellenbehandlung, vor allem in den angelfächsischen Ländern eine große Rolle. N e y m a n n und K ö n i g berichten von 24% Besserungen nach

Diathermiebehandlungen, wogegen sie bei Malaria nur 22% Besserung insgesamt sahen (!), Cortesi hatte 27,7% gute Remissionen und 22,2% Besserungen, Freeman, Fong, Bamford dagegen hatten völlig negative Resultate mit dieser Behandlungsart. Mit der Ultrakurzwellenbehandlung oder Radiothermie berichten einige Amerikaner ebenfalls gute Ergebnisse, doch sei eine größere Anwendungsmöglichkeit wegen der Kostspieligkeit und Gefährlichkeit der Apparatur nicht gegeben.

Wenn zusammenfassend die Frage, welcher Behandlungsmethode der Paralyse der Vorzug zu geben sei, beantwortet werden soll, so konnten wir feststellen, daß die Malariabehandlung bei weitem die häufigst angewendete Methode ist. Dicht dahinter folgt die Recurrensbehandlung. Die Erfolge beider Methoden scheinen in etwa gleich zu sein. Kein anderes Verfahren hat ähnliche Verbreitung und Behandlungserfolge aufzuweisen.

Daß die oben angeführten Faktoren, die auf den Remissionsverlauf von Einfluß sind, großes Interesse verdienen, hat seine Berechtigung auch schon darin, daß man prognostisch hoffnungslose Fälle von der Fieberbehandlung ausschließen und ihrem rasch progredienten Schicksal überlassen sollte, „um nicht chronische Paralyse“ zu züchten, die nach P o e n i t z nur eine soziale Belastung bedeuten und ungeheure Summen aus dem Volksvermögen verbrauchen. Für die Prognosestellung sind eine ganze Reihe von Faktoren zu beachten. Fassen wir unsere Ergebnisse zusammen, so zeigt sich, daß die besten Remissionschancen vorhanden sind bei Fällen, bei denen:

1. die Krankheitsdauer noch unter sechs Monaten liegt,
2. eine spezifische Vorbehandlung erfolgt ist,
3. bei einem Alter der Patienten zwischen 30—35 Jahren,
4. bei männlichem Geschlecht des Patienten,
5. bei pyknischem Körperbau und Gewichtsanstieg nach der Behandlung,
6. bei manischen und depressiven Formen,
7. bei hohem Fieber und großer Gesamtfieberstundenzahl,
8. bei intensiver spezifischer Nachbehandlung.

Ohne Bedeutung erscheinen die serologischen Verhältnisse vor oder unmittelbar nach der Behandlung, des weiteren Blutgruppenzugehörigkeit und Blutsenkung, neurologische Begleitsymptome, Zeitpunkt des Einsetzens der Remission.

Anhangsweise möchte ich nun zum Schluß die Behandlungsergebnisse der Autoren wiedergeben, deren Schrifttum mir zugänglich war. Obwohl mir das Einteilungsschema nach Gerstmann-Jossmann am besten schien, lege ich in dieser Tabelle das Weygandtsche Schema zugrunde, das als ältestes die größere Verbreitung gefunden hat und in den angeführten Mitteilungen am häufigsten verwandt wurde. Es sei gestattet die Einteilung von Weygandt nochmals anzuführen: In die erste Gruppe kommen diejenigen, die wieder voll berufstätig sind und fast keine abnormen Symptome zeigen. Der Gruppe II gehören die Berufstätigen mit geringen psychischen Defekten an. Zur Gruppe III rechnet Weygandt diejenigen, die psychisch geschwächt, nur unter Aufsicht arbeitsfähig sind. Gruppe IV enthält die unveränderten und V die progressiven und gestorbenen Fälle.

Ergebnisse der Malaria-Behandlung.

Nr.	Jahrgang	Autor	Zahl d. F.	I	II	III	IV	V
1.	1924	Reefe	75	20,0%	I+II 50,6%	—,0%	29,4%	10,6%
2.	24	Gans	17	29,5%	23,5%	5,2%	35,2%	5,2%
3.	24	Worster Drought	14	21,4%	28,5%	28,5%	7,1%	14,2%
4.	25	Jossmann	100	21,0%	20,0%	—,0%	39,0%	12,0%
5.	25	Grant	40	12,5%	I+II 82,5%	—,0%	—,0%	—,0%
6.	25	Untersteiner	40	—,0%	60,0%	—,0%	40,0%	—,0%
7.	25	Janzen	21	4,7%	9,5%	28,5%	57,1%	—,0%
8.	25	Boumann	60	52,0%	—,0%	—,0%	48,0%	—,0%
9.	25	Schuster	55	23,0%	11,0%	—,0%	66,0%	—,0%
10.	25	Herzig	100	15,0%	12,0%	—,0%	—,0%	—,0%
11.	25	Nyirö	30	23,0%	40,0%	—,0%	38,2%	—,0%
12.	25	Jakob	50	2,0%	26,0%	36,6%	18,0%	18,0%
13.	25	Weygandt	329	25,8%	18,2%	25,5%	23,4%	7,0%
14.	26	Gerstmann	400	33,0%	—,0%	14,2%	—,0%	—,0%

Nr.	Jahr- gang	Autor	Zahl d. F.	I	II	III	IV	V
15.	26	Borremans	30	—,0 %	33,3 %	46,6 %	—,0 %	20,0 %
16.	26	Graham	50	—,0 %	36,0 %	14,0 %	—,0 %	20,0 %
17.	26	Schulze	215	26,2 %	—,0 %	13,5 %	30,0 %	20,0 %
18.	26	Bofch	40	17,6 %	29,4 %	29,4 %	20,5 %	2,9 %
19.	26	Meyer	135	11,8 %	14,8 %	25,9 %	25,9 %	21,4 %
20.	26	Raven	30	23,3 %	23,3 %	—,0 %	36,6 %	16,6 %
21.	26	Pfister	36	16,6 %	—,0 %	30,5 %	40,6 %	11,1 %
22.	26	Baender	300	36,0 %	—,0 %	16,3 %	47,7 %	19,3 %
23.	26	Salinger	109	I—II+III		47,7 %	39,4 %	12,8 %
24.	27	Mingazzini	150	40,0 %	—,0 %	—,0 %	60,0 %	—,0 %
25.	27	Driver	31	25,6 %	25,6 %	12,7 %	22,5 %	12,7 %
26.	27	Kasperek	89	9,0 %	20,0 %	28,1 %	24,7 %	18,0 %
27.	27	Read	59	18,6 %	20,3 %	13,5 %	50,6 %	6,7 %
28.	27	Bravetta	114	—,0 %	31,8 %	8,7 %	22,8 %	30,8 %
29.	27	Geratowitch	50	29,3 %	12,4 %	—,0 %	4,3 %	15,3 %
30.	27	Mc. Intray	42	20,0 %	12,5 %	20,0 %	12,5 %	30,0 %
31.	27	Somogyi	100	18,0 %	—,0 %	18,0 %	38,0 %	26,0 %
32.	27	Marienfeld	36	13,9 %	—,0 %	5,6 %	52,7 %	27,8 %
33.	27	Askgaard	160	16,0 %	9,0 %	—,0 %	10,0 %	8,0 %
34.	27	De Paoli	35	34,2 %	—,0 %	28,5 %	17,1 %	20,0 %
35.	27	Radiska	91	10,0 %	II+III		27,2 %	28,4 %
36.	28	Vallejo	63	9,5 %	19,0 %	14,2 %	44,4 %	12,6 %
37.	28	Loberg	103	38,7 %	16,5 %	—,0 %	24,0 %	4,0 %
38.	28	Bunker	156	33,3 %	II+III		17,3 %	23,7 %
39.	28	Westphal	100	13,0 %	18,0 %	13,0 %	29,0 %	—,0 %
40.	28	Pacheco	33	12,1 %	15,1 %	36,3 %	12,1 %	24,2 %
41.	29	Cardillo	129	38,7 %	II+III		12,4 %	31,1 %
42.	29	De Angelis	100	20,0 %	20,0 %	30,0 %	30,0 %	—,0 %
43.	29	Vermeylen	64	30,0 %	II+III		18,1 %	30,0 %
44.	29	Brander	105	33,3 %	II+III		15,2 %	24,7 %
45.	30	Fracassi	26	27,6 %	—,0 %	15,3 %	19,1 %	7,6 %
46.	30	Mo	85	31,4 %	12,3 %	15,7 %	25,8 %	14,6 %
47.	30	Paulian	155	30,4 %	34,1 %	—,0 %	21,0 %	13,6 %
48.	31	Störning	75	24,0 %	30,0 %	23,0 %	23,0 %	—,0 %
49.	31	Ostenfeld	95	4,2 %	6,3 %	17,8 %	57,8 %	13,6 %
50.	31	Pfeifer	300	10,0 %	II+III		51,3 %	18,4 %
51.	31	Bahr	240	29,0 %	II+III		40,0 %	IV+V
52.	31	Swierczek	101	10,0 %	II+III		18,0 %	61,0 %
53.	32	Hendrikfen	319	—,0 %	24,5 %	23,2 %	45,1 %	7,2 %
54.	32	Cortesi	82	18,4 %	14,4 %	13,0 %	—,0 %	27,6 %

Nr.	Jahr- gang	Autor	Zahl d. F.	I	II	III	IV	V
55.	32	Hinsie	197	21,0 %	—,0 %	19,0 %	16,2 %	43,8 %
56.	32	Heinrich	96	26,0 %	II+III	24,0 %	31,2 %	18,8 %
57.	32	Sudo	100	68,0 %	—,0 %	3,0 %	22,0 %	7,0 %
58.	32	Stanley	181	28,7 %	III+III	8,3 %	21,5 %	41,4 %
59.	32	Bendixen	72	19,4 %	13,8 %	27,7 %	22,2 %	16,6 %
60.	33	Villaciau	50	6,0 %	II+III	8,0 %	80,0 %	6,0 %
61.	33	Nicol	200	16,0 %	15,0 %	—,0 %	42,0 %	27,0 %
62.	33	Langer	128	19,2 %	9,5 %	—,0 %	24,4 %	43,8 %
63.	33	Omaru	260	40,4 %	15,0 %	—,0 %	26,1 %	18,5 %
64.	33	Pons	114	I+II	29,0 %	12,8 %	25,5 %	12,8 %
65.	33	Barbeau	71	56,5 %	II+III	9,3 %	44,1 %	6,9 %
66.	34	Benedek	93	13,9 %	15,0 %	23,6 %	29,6 %	17,2 %

7126

Ergebnisse der Recurrens-Behandlung.

1.	1924	Steiner	76	35,5 %	II+III	2,6 %	39,4 %	22,3 %
2.	25	Boenig	30	16,6 %	II+III	13,3 %	26,6 %	43,3 %
3.	25	Peters	16	66,6 %				
4.	28	Benedek- Kulzsar	74	12,1 %	14,8 %	22,9 %	29,9 %	15,8 %
5.	28	Horn	33	24,3 %	II+III	21,2 %	33,3 %	21,2 %
6.	29	Poenitz	78	26,9 %	—,0 %	25,9 %	24,3 %	23,0 %
7.	31	Marie	51	35,2 %	—,0 %	—,0 %	31,3 %	33,3 %
8.	31	Sagel	269	12,6 %	27,8 %	20,8 %	25,2 %	19,0 %
9.	31	Jossmann	75	5,3 %	13,3 %	40,0 %	IV+V =	4,0 %
10.	34	Benedek	92	8,7 %	9,7 %	18,4 %	43,4 %	19,5 %

794

Schrifttum.

- Amabilino, Rosario: Terapia della paralisi progressiva Osp. Psichiatri. Univ. Palermo 1934.
- Asgard, Vagn: Vorläufige Resultate einjähriger Malariabehandlung von Paralytikern. Ugeskrift f. læger. Jg. 86. Nr. 15. 1924.
- Malariabehandlung der progressiven Paralyse, Ugeskrift f. læger, Jg. 89. Nr. 12. 1927.
- Baender, Erich: Untersuchungen über Remissionen bei progressiver Paralyse im besonderen nach Malariabehandlung. Z. f. gef. Neur. u. Psych.
- Bahr, Max: The so — called recovery of paresis. Med. leg. Jg. 18, 1931.
- Malaria therapy of paresis. Journ. of the Indiana state med. assoc. Bd. 19. Nr. 12. 1926.
- Balogh, Géza: Die Ausichten der Therapie bei der progressiven Paralyse. Gyogyazat Jg 65, Nr. 42, 1925.
- Barbeau, Antonio: Nouvelles réflexions et statistique sur la malaria-thérapie. Un. med. Canada 62, 1933.
- Bilan de six ans et demi de malaria thérapie à l'hôpital de Bordeaux. Un. med. Canada 63, 1934.
- Bayly, H. Wansey: The malariel treatment of general paralysis. Practitioner Bd. 119, Nr. 6, 1927.
- Benedek: Der heutige Stand der Behandlung der progressiven Paralyse, 1926, Berlin. S. Karger. Abh. Neur. ufw. H. 34.
- Benedek u. Kulcsar: Beiträge zur Recurrens-Behandlung der progressiven Paralyse. Dtsch. Ztschr. f. Nervenheilkde. Bd. 98.
- Benedek: Terapia moderna della paralisi progressiva. Riforma med. 1933.
- Bendixen, Karl: Malariabehandlung der progressiven Paralyse. Norsk. Mag. Laegevidensk. 93, 1932.
- Binswanger: 88. Verh. dtsh. Naturforscher u. Ärzte, Innsbruck. Sitzg. v. 27. 9. 24. Zbl. 39, 1925.
- Blum, E.: Über die Ergebnisse der Malariabehandlung der progressiven Paralyse und Tabes an der Provinzial-Heil- und Pflanzanstalt, Johannisthal bei Siedel. Psychiatr. neur. Wschr. Jg. 29, 1927.
- Boening, H.: Zur Recurrens-Behandlung der Par. Psych. neur. Wschr., Jg. 26, Nr. 31/32, 1924.
- Borremans, P.: Traitement de la paralysie général par l'inoculation de malaria. Journ. de neurol. et de psychiatrie, Jg. 25, Nr. 4, 1925.

- Bosch: Gonzalo u. Mo Arturo: Die Malariatherapie der Paralyse.
Semana med. Jg. 33, Nr. 1, 1926.
- Bostroem: Über die Recurrens- und Malariatherapie der progressiven Paralyse. Prakt. Gesichtspunkte bei der Beurteilung d. Remiss.
Zbl. 42, 1926.
- Bouman, K. H.: Die Fieberbehandlung bei Dementia paralytica.
Psychiatr. en neurol. bladen, Jg. 1924, Nr. 5.
- Brandenburg, K.: Beobachtungen über die Malariabehandlung der Paralyse. Med. Klin. Jg. Nr. 23, 1927.
- Brander, J.: Discussion on prognosis. — Zbl. 53, 1929.
- Bravetta, E.: Due anni di terapia malarica della paralisi progressiva.
Bole d. soc. med.-chir. Pavia, Jg. 1, Nr. 5, 1926.
- Briner, Otto: Über den Verlauf der progressiven Paralyse ohne und mit Fieberbehandlung. Z. Neur. Pŷch. 128, 1930.
- Bunker, jr. and G. H. Kirby: The treatment of general paralysis by inoculation with malaria Arch. of neurol. a. psychiatry, Bd. 16, Nr. 2, 1926.
- — The place of malaria in the treatment of general paralysis. Med. journ. a record Nr. 127, Nr. 4, 1928.
- Bunker, jr.: Recent methods in the treatment of general paralysis.
A brief survey. Amer. J. Psychiatry 8, 1929.
- Caldwell, W. A.: A survey of probable pronostic factors in the treatment of general paralysis. Brit. Med. Jg. 1931, Nr. 3702.
- Cardillo, Furio: La terapia infettiva malaria della neurosifilide.
Biol. med. Bd. 17, Nr. 1—2, 1927.
- Ulteriore contributo clinico alla studio della malarioterapia.
Cervello Jg. 7, Nr. 3, 1928.
- Claude, Henri; René Targowla et Michel Cénac: Le traitement de la paralysie général par le Paludisme expérimental. Ann. de méd. Bd. 21, Nr. 3, 1927.
- Claude, Cossa et Garand: Résultats éloignés de la malariathérapie dans la paralysie générale. Bull. Acad. Méd. Paris III. 104, 1930.
- Claude et P. Masquin: L'examen du fond mental des paralytiques généraux par la méthode des tests. Ann. méd. psychol. 91, II. 1933.
- — Le devenir des par. généraux malarisés, press. méd. 1933, Nr. 99.
- Cortesi, Tancredi: Sei anni di malario-terapia nei paralitici. Rass. Studi psichiatri. 20, 1931.
- Dattner, Bernhard: Epikrisen malariabehandelter Paralytiker. Klin. Wfchr. Jg. 7, Nr. 21, 1928.

- Weitere Epikrisen malariabehandelter Paralytiker. *Klin. Wöchr.* 1930, II.
 - Angaben über die Liquoruntersuchungen von 129 mit malaria-behandelten Paralytikern. *Klin. Wöchr.* Jg. 7, Nr. 21.
 - Neue Ergebnisse der Paralysebehandlung und Paralyse-Forschg. *Fortschr. d. Neurol. u. Psych.* VI. Jg., H. 6, 1934.
- De Angelis, Eugenio: Le alterazioni della scrittura nella paralisi progressiva prima e dopo la malarioterapia. *Arch. gen. di neur. Zbl.* 51, 1929.
- De Paoli, Nino: Terapia della paralisi progressiva *Riv. sperim. di freniatr., arch. ital. per le malatt. nerv. e ment.* Bd. 50, H. 3—4, 1927.
- Discussion on prognosis and treatment of general paralysis of the insane. *Sect. of psychiatry a. neurol., London, 12. a. 14. II. 29. Proc. roy. Soc. Med.* 22, 1929 (Stoddart, Brander, E. T. Meagher, D. Nabarro.)
- Donner, Sven: Die Behandlung der progr. Paralyse durch Malaria-Überimpfung. *Finska läkaresällskapets handlingar* Bd. 67, Nr. 1, 1925.
- Driver, Gammel, a. Karnosh: Malaria treatment of central nervous system syphilis. *Journ. of the Americ. med. assoc.* Bd. 87, Nr. 22, 1926.
- Ducosté, Maurice: L'impaludation cérébrale. *Arch. internat. Neur.* 51, II., 1932.
- Eldridge, Watson: Treatment of Paresis. *Journ. of the Americ. med. assoc.* Bd. 85, Nr. 15, 1925.
- Ferraro, Armando a. Theodore Fong: The serology of general paresis in the malaria treated cases. *Med. journ. a. record.* Bd. 124, Nr. 9—11, 1926.
- The malaria treatment of general paresis. *Journ. of nerv. a. ment. dis.* Bd. 65, Nr. 3, 1927.
- Fleck, Ulrich: Über Malariatherapie bei Paralyse. *Zschr. f. gef. Neur. u. Psych.* Bd. 96, H. 1—3, 1925.
- Über die Malaria und Recurrens-Behandlung der Paralyse, *Verf. bayer. Psych., München*, 25. bis 26. 7. 1925. *Zbl.* 42, 1926.
 - Über die Malaria und Recurrens-Behandlung der Paralyse. *Arch. f. Psych. u. Nervenkrankh.* Bd. 75, H. 4—5, 1925.
- Fracassi, Teodoro: Malariabehandlung. *Rev. med. del. Rosario* 19, 1929.
- Gans, A.: Die Resultate der Malaria-Impfung der dementia paralytica im Provinciaal Ziekenhuis nabij Santpoort. *Neurotherapie*, Jg. 1927, Nr. 3/4.

- Garkavi, Ch.: Behandlung der Paralyse mit Malaria. Medezinskaja Myssl Nr. 8/10, 1924.
- Geratowitch: Über Malariatherapie bei Paralyse. Arch. f. Pŷch. u. Neur., Bd. 78. H. 1—2, 1926.
- Gerŷtmann: Die Malariabehandlung der progr. Paralyse, Wien, Springer. 1925.
- Über den jetzigen Stand der Malariatherapie der progr. Paralyse mit besonderer Berücksichtigung neuerer Erfahrungen. Z. Neur. Pŷch. Bd. 81, H. 3—4, 1923.
 - Über die grundsätzliche Wirkungsmöglichkeit der Malariabehandlung bei der progr. Paralyse. Wien. Klin. Wöchr., Jg. 40, Nr. 13, 1927.
- Gerzanits, Pal.: Werden die verschiedenen klinischen Formen der progressiven Paralyse in ihrer Entwicklung und ihren Remissionen durch die Blutgruppen beeinflusst? Gyogyaszat 1931, II.
- Gonzalez, Pinto: Resultate der Katamnese bei Paralyse mit Malariabehandlung. Ass. Acad. méd.-quir. espan., Bd. 19, 1932.
- Grabow u. J. Krey: Der Imprätrattenbiß in der Behandlung der progr. Paralyse. Z. Neur. 121, 1929.
- Graham, N.: The malarial treatment of general paralysis. Journ. of mental science Br. 17, Nr. 294, 1925.
- Grant, A. and J. W. Silverston: Malaria-therapy in general paralysis. Journ. of ment. science. Br. 70, Nr 288, 1924.
- Gyarfas, Kalman: Das Pyrifur in der Therapie der Paralyse. Orv. Hetil. 1931, I.
- Haas, J.: Ergebnisse der Malariabehandlung der progress. Paralyse. Z. Neur. Pŷch. Bd. 136, 1931.
- Hecht, S.: Statistische und vergleichende Untersuchungen über die klinischen Formen der progr. Paralyse und ihre prognostische Bedeutung vor und nach Einführung der Malariatherapie. Arch. f. Pŷch. u. Neur. Bd. 81, H. 1, 1927.
- Hegedüs, Lajos: Malariabehandlung der Syphilis des Nervensystems auf Grund von 100 Fällen. Orv. Hetil. 1929, I.
- Heinrich, R.: Erfolge der Malariatherapie bei progr. Paralyse in der Nervenklinik Wiefengrund der Wittenauer Heilstätten. Abh. Neur. ufw. H. 65, 1932.
- Heinze, E.: Über den Verlauf der juvenilen Paralyse nach Malariabehandlung. Abh. Neur. ufw. H. 65, 1932.
- Hendrikŷen, v.: Die Behandlung der Dementia paralytica mit Infektionskrankheiten. Hosp. tid. 1931, I.
- Untersuchungen über die Resultate der Malariabehandlung bei Dementia paralytica. Acta psychiatr. Kobenhavn. 6, 1931.

- Herrmann, G.: Über die Malariabehandlung der juvenilen Paralyse. Med. Klin. Jg. 20, Nr. 22, 1924.
- Malariatherapie der progr. Paralyse. Verh. dtsh. Ärzte, Prag. Sitzg. v. 28. 5. 1924. Zbl. 39, 1925.
- Herzig, E.: Zur Malariabehandlung der Paralysis progressiva. Wien. Klin. Wschr. Jg. 37, Nr. 4, 1924.
- Hinsie, L.: Malarial treatment of female patients with general paralysis. Psychiatr. Quart. 3, 1929.
- and J. Blalock: Treatment of general paralysis, Results in 197 Cases treated from 1923—1926. Amer. J. Psychiatry 11, 1931.
- — Treatment of general paralysis by radiotherapy. Psychiatr. Quart. 6, 1932.
- Hoff, Ferd.: Unspezifische Therapie. Berlin, Springer. 1930.
- Horn, Ludwig: Liquor-Befunde bei der Malariabehandlung der Paralyse, Jahrb. für Psych. u. Neur. Bd. 44, H. 1, 1925.
- Zur Metaluesbehandlung m. besond. Berücksichtigung der Malaria und Recurrenstherapie. Münch. med. Wschr., Jg. 73, Nr. 47, 1926.
- und O. Kauders: Der Heilungsverlauf der progr. Paralyse mit besonderer Berücksichtigung der Frage der Rezidivverhütung. Psych. Neur. Wschr. 1931, II.
- — Über die klinischen Typen der malariabehandelten Paralyse, die therapeutischen Maßnahmen zur Erhaltung der Remission und über Rezidivprophylaxe. Jb. Psychiatr. 48, 1932.
- Vergleichende Nachuntersuchungen bei malaria- und recurrens-behandelten Paralytikern. Psych. neurol. Wschr. Jg. 1928, II.
- Janzen, E. u. Hutter, A.: Resultate der Malariabehandlung der Dementia paralytica, Psychiatr. neurol. bladen. Jg. 1924.
- Jakob, Charlotte: Kurzer Bericht über Malariabehandlung der progress. Paralyse in der Universitätsnervenklinik zu Königsberg. Arch. f. Psych. u. Nervenkr. Bd. 71, Nr. 5, 1924.
- Johnson, G. and R. Jefferson: Medical aspects of malaria therapy in neurosyphilis. J. nerv. Dis. 73, 1931.
- Jossmann, P.: Erfolge der Reiztherapie bei progr. Paralyse, klinische Ergebnisse. Allg. Zschr. Psychiatr. 95, 1931.
- und P. Steenaerts: Über Malariabehandlung der progress. Paralyse. Mfchr. f. Psych. u. Neur. Br. 66, 1924.
- Kaltenbach: Über einige prognostische Schlüsse aus dem Liquoranalysen bei malariabehandelten Paralytikern. Arch. f. Psych. u. Nervenkr. Bd. 71.

- Kasperek, G.: Ein Beitrag zur Behandlung der progr. Paralyse mit Malaria. Z. Neur. Bd. 106, 1926.
- Kihn, B.: Die Behandlung der quaternären Syphilis mit akuten Infektionen. München, Bergmann. 1927.
- Weitere Erfahrungen mit der Infektionsbehandlung der progressiven Paralyse. Arch. f. Psychiatr. und Nervenkr., Bd. 75, 1925.
- Kirby, G. and Bunker, H.: Types of therapeutic response observed in the malaria treatment of general paralysis. Amer. Journ. of psychiatry. Bd. 6, Nr. 2, 1926.
- Kirschbaum, W.: Klinische Untersuchungen und Behandlungsergebnisse bei seniler Paralyse. Z. Neur. Psych. Bd. 128, 1930.
- Über Malaria u. Recurrens-Fieberbehandlung bei progress. Paralyse, Z. Neur. Psych. Bd. 75, 1922.
- Die klinische Bedeutung der Liquorphänomene bei der Infektionsbehandlung bei der Dementia paralytica. Jahresverf. d. Deutschen Vereins f. Psychiatrie in Breslau am 9. 4. 1931.
- Klare, H.: Metaluesprobleme unter dem Gesichtswinkel der Fieberbehandlung. Allg. Z. Psych. 92, 1929.
- Köhler, Egon von: La paralyse générale et le changement de son syndrome typique en d'autres formes de psychoses atypiques à la suite de la leucopyréthérapie. Rev. méd. Suisse rom. 51, 1931.
- König: Zur Recurrensbehandlung der progr. Paralyse, 99. Verh. d. psych. Ver. d. Rheinprovinz. Bonn, 26. 7. 24. Zbl. 39, 1925.
- Köster, Fritz: Über die nach sozialen Gesichtspunkten erfolgten Nachuntersuchungen der unter Fürsorge stehenden behandelten Paralytiker. Arch. f. Psychiatr. 98, 1932.
- Kräpelin: Klin. Psychiatrie, I. Teil, 1927, Leipzig, Barth.
- Langer: Malariabehandlung bei progr. Paralyse Psychiatr. neurol. Wchr. 1933.
- Larrivé, E.: Deux cas de paralysie générale juvenile. Lyon méd. 1931, II.
- Lees, R.: Treatment of general paralysis of the insane by induced malaria. Brit. med. Jg. 1931, Nr. 3865.
- Leroy, R. et Médakowitch: Paralysie générale et malariathérapie. Paris, G. Doin et Cie. 1931
- Levin, H. L.: The results of malaria treatment of paresis. N.Y. State. J. Med. 28.
- Loberg, Karl: Etwa 2-jährige Erfahrungen mit der Malariabehandlung nebst Versuche für Erklärung einiger wesentlicher Probleme. Svenska läkartidningen. Jg. 23, Nr. 41—42, 1926.

- Über die Diagnose d. beginnenden Paralyse nebst Bemerkungen über die Malariabehandlung. Svenska läkartidningen. Jg. 25, Nr. 2, 1928.
- Marie, Auguste: La récurrento-thérapie de la paralysie générale. Arch. internat. Neur. 50 I, 1931.
- et Médakowitch: La fièvre récurrente dans le traitement de la paralysie générale et du tabès. Paris: J. Reyronnet et Cie. 1932.
- Marienföld, A.: Über die Ergebnisse der Malariabehandlung bei progr. Paralyse an der psychiatr. und Nervenlinik Rostock-Gehlsheim. Psych. Neur. Wschr. Jg. 28, Nr. 39/41, 1926.
- Martinez, A.: Die Malariatherapie, Prensa med. argent. 16, 1930.
- Mauz, Friedrich: Zur Psychopathologie malariaemittierter Paralytiker. Zschr. gef. Neur. u. Psych. Bd. 127, 1930.
- Mc Intyre, Howard D. and Aurelia P. Mc. Intyre: Malaria inoculation in the treatment of general paralysis. Arch. of neurol. & Psychiatry, Bd. 16, Nr. 2, 1926.
- Menninger, W. C.: Juvenile Dementia paralytica. A Study of forty cases. J. Amer. med. Assoc. 95, 1930.
- Meyer, E.: Zur Malariabehandlung der progr. Paralyse. Dtsch. med. Wschr., Jg. 52, Nr. 8, 1926.
- Meyer, Fr.: Fieberbehandlung der progr. Paralyse mit Pyrifur. Psych. Neur. Wschr. 1928, II.
- Mingazzini, G.: Terapia malarica della paralisi progressiva. Bull. e atti d. reale accad. med. di Roma, Jg. 53, H. 2, 1927.
- Misch-Frankl, Käthe: Die soziale Einordnung der malariabehandelten Paralytiker. Abh. Neur. ufw. H. 65, 1932.
- Mo, Arturo: Wert d. Malariatherapie bei d. Paralyse. Prensa méd. argentina, Jg. 12, Nr. 33, 1926.
- Fieberbehandlung der Paralyse. Am. Acad. méd.-quir. espan. 15, 1928.
- Möllenhoff, Fritz: Malariatherapie und soziales Niveau. Arch. Neur. ufw. H. 65, 1932.
- Neymann, Clarence A.: Erzeugung künstl. Fiebers und die Behandlung der Dementia paralytica mit diathermischen Strömen. Z. Neur. 132, 1931.
- Neymann, C. L. A. and Osborne S. L.: The treatment of dementia paralytica with hyperpyrexia produced by diathermy. J. amer. med. Assoc. 96, 1931.
- and König, M. T.: Treatment of dementia paralytica. Comparative therapeutic results with malaria, rat-bite fever and diathermy. J. amer. med. Assoc. 96, 1931.

- Nicol, W. D.: A review of seven years malarial therapy in general paralysis. *J. ment. Science*, 78, 1932.
- Nobbe, H.: Praktische Erfahrungen mit der Pyriferebehandlung. *Arch. f. Psychiatr.* 99, H. 1, 1933.
- u. Knab: Untersuchungen über die sozialen Auswirkungen der Malariabehandlung bei Paralytikern. *Arch. f. Psychiatr.* 94, 1931.
- Nonne, M.: Meine Erfahrungen über die Malariabehandlung der Paralyse. *Med. Klin. Jg.* 21, Nr. 49, 1925.
- Nyirö, Gyula u. Stief, Sander: Die Malaria tertiana-Behandlung der progressiven Paralyse. *Orvosi Hetilap. Jg.* 68, Nr. 44, 1924.
- u. F. Petrowich: Die reaktive Änderung der seelischen Symptome bei der Dementia paralytica progressiva nach der Malariatherapie. *Gyogyaszat, Jg.* 67, Nr. 34, 1927.
- u. Tobay, Laszlo: Über die Malariabehandlung der Dementia paralytica mit Beobachtung der Remissionen verursachenden Faktoren. *Gyogyaszat*, 1928, II.
- Olavide, José: Die Malariabehandlung der Paralyse, Faktoren, die ihre Refulate beeinflussen. *An. Hosp. José y Adéla.* 1, 1930.
- O'Leary, P. A.: Treatment of neurosyphilis by malaria. *Journ. of the Americ. med. assoc.*, Bd. 89, Nr. 2, 1927.
- The value of treatment by malaria in neurosyphilis. *Med. Klin. N. Amer.* 12, 1929.
- and Wels, A. L.: Treatment of Neurosyphilis with Malaria. *J. Amer. med. Assoc.* 101.
- Omaru, J. und Eguchi, H.: Statist. Betrachtungen über den Erfolg der Malariabehandlung bei 260 Paralytikern. *Fukuoka-Igwadai-gaku-Zasshi* 25, Nr. 12, 1932. (Zbl. 67, 1933).
- Ostenfeld, H.: Malariabehandlung der Dementia paralytica auf der Frauenabteilung des St. Hans-Hospitals Kopenhagen. *Hosp. tid.* 1930, II.
- Pacheco e Silva: La malariathérapie dans la paralysie générale. *Mém. do hosp. de Juquery, Jg.* 3/4, Nr. 3/4, 1927.
- Paol, A.: Dementia paralytica: Therapeutic measures and results. *J. of Neur.* 10, 1929.
- Pasqualini, Ruggero: Esiti a distanza della piritoterapia nella paralisi progressiva. *Osp. psichiatr.* Nr. 2, 1936.
- Pastrowich: La malariatherapia della paralisi progressiva, *Gazz. d. osp. e d. clin. Jg.* 46, Nr. 43, 1925.
- Paulian, Démentre: La malariathérapie. Bilan sur quatre ans de thérapie. *Revue neur.* 36, I, 1929.
- La malariathérapie dans les affections syphilitiques du système nerveux. *Arch. dermato-sypholog. Hop. St. Louis* I, 1928.

- Les résultats imméd. et lointains de la Malariathérapie en syphilis. Arch. of Dermatol. 4, 1932.
- Peters, L.: Zur Recurrensbehandlung der Paralyse. Arch. f. Psychiatr. u. Nervenkrankheiten. Bd. 73, H. 5, 1925.
- Pfeifer, B. u. Rohden, F. v.: Sechs Jahre Malariatherapie in der Landesheilanstalt Nietleben. Dtsch. Z. f. Nervenheilk. 117/119, 1931.
- Pfister, O.: Über Malariabehandlung der progr. Paralyse. Schweiz. med. Wschr. Jg. 56, Nr. 17, 1926.
- Pijper A. and E. Russel: Malaria treatment of général paralysis. South African. med. record. Bd. 24, Nr. 13, 1926.
- Pires, Waldemiro: Zur Behandlung der progr. Paralyse insbesondere durch Malariatherapie. Arch. brasil. Med. 19, 1929.
- Plachner, Emil: Beziehungen zwischen psychischer Besserung und Liquorfanierung bei der progr. Paralyse nach Fieberbehandlung. Inang.-Diff. Bonn 1934.
- Plaut, F. u. Steiner, G.: Die Recurrensthérapie der syphiligen Nervenkrankheiten. Z. f. gef. Neur. u. Psych., Bd. 94, H. 1, 1924.
- Die Reizkörpertherapie der progressiven Paralyse. Humorale Beeinflussung und biologische Probleme. Versammlungsreferat, Breslau 9. IV. 1931.
- Plehn: Die Malariabehandlung der progr. Paralyse. Dtsch. med. Wschr. Jg. 50, Nr. 5, 1924.
- Die Malariabehandlung der progr. Paralyse und der Tabes. Dtsch. med. Wschr. Jg. 53, Nr. 1, 1927.
- Poenitz, K.: Die Diagnose der abgelaufenen paralytischen Erkrankung. Dtsch. Zschr. Nervenheilk. 114, 1930.
- u. Schramm, F.: Zur Recurrensthérapie der Paralyse. Z. Psych. u. Neur. 37, 1929.
- Pons, Balmes J.: Remissionen der Paralyse bei Malariabehandlung. Ecos espan. dermat. 8, Nr. 86, 1932.
- Remissionen der Paralyse durch Malariabehandlung. Rev. méd. Barcelona, 18, 1932.
- Popoff, N.: Zur Malariabehandlung der progr. Paralyse in Bulgarien. J. Univ. Sofia. Med. Fak. 9, 1931.
- Radimska, — Jandova: Erfolge der Malariakur bei der progr. Paralyse vom klin. u. pathol.-anatom. Standpunkte. Bratislavské lekasske listy. Jg. 6, H. 8, 1927.
- Ranichburg, Pal.: Der therapeutische Wert der Fieberbehandlung der progr. Paralyse. Orv. Hetil. 1931, I.

- Raven, von: Der heutige Stand der Infektionstherapie der progr. Paralyse. Veröff. a. d. Geb. d. Medizinalverwaltung. Bd. 21, H. 1, 1926.
- Read, Ch., J. Nervancy and H. Tucker: Malaria treatment of „institution“ paresis, Raport of 59 Cases. Illinois med. journ. Bd. 51, Nr. 1, 1927.
- Reefe, H. u. Peter, K.: Die Einwirkung der Malaria tertiana auf die progr. Paralyse. Med. Klin. Jg. 20, Nr. 12/13, 1924.
- Reid, B.: Results of eight years of malarial therapy. J. ment. Sci. 78, 1932.
- Rhoden, von, Ziegelroth u. Wolter, H.: Der Einfluß der Malaria-behandlung auf das humorale Paralyse-syndroms auf die Permeabilität der Blutliquorfranke. Arch. f. psych. Bd. 95.
- Rodriguez-Arias, B.: Su la malariaterapie de la paralyse générale. Revue neur. 36 I, 1929.
- Ergebnisse der Malariabehandlung der Neurosyphilis. Actes dermo-sifiliogr. 1934.
- Runge u. Mulzer: Die Pyrikerbehandlung der Syphilis und Metasyphilis des Nervensystems. Dtsch. med. Wschr. 1928, II.
- Ruprecht, E.: Zur Pyrikerbehandlung der progr. Paralyse. Psychiatri. neurol. Wschr., 1932.
- Sabatcky, Kurt: Gibt es Unterschiede in der Wirkungsweise der Malariatherapie der progr. Paralyse bei Männern und Frauen. Psych. neurol. Wschr. Jg. 28, Nr. 45—46, 1926.
- Sagel, W.: Zur Behandlung der Dementia paralytica mit Recurrens Duttoni. Münch. med. Wschr. Jg. 71, Nr. 12, 1924.
- Neunjährige Erfahrungen mit Recurrensbehandlung der fortschreitenden Hirnlähmung in der staatlichen Heil- und Pflegeanstalt Arnsdorf i. S. Z. Neur. 137, 1931.
- Salinger, Fr.: Die Ergebnisse der Malariabehandlung der progr. Paralyse. Psychiatri. neurol. Wschr. Jg. 29, Nr. 27, 1927.
- Siemerling: Zur Behandlung der progr. Paralyse und Tabes mit Pyriker. Dtsch. med. Wschr. 1927, Nr. 50.
- 2 Jahre Pyrikertherapie. Klin. Wschr. 1930, 410.
- Zur Behandlung der progr. Paralyse und Tabes mit Pyriker. Dtsch. med. Wschr. Jg. 53, Nr. 50, 1927.
- Simon, Th.: Examen de paralytiques généraux avant et après traitement. Ann. méd. psychol. 88, II, 1930.
- Somogyi, I.: Die Behandlung der progr. Paralyse vom klinischen, serologischen und histologischen Gesichtspunkte. Orvosképzés. Jg. 17, H. 1, 1926.

- Über Malariabehandlung im Initialstadium der Paralyse. Pfy-
chiatr. neur. Wschr. 1930, I.
- u. Andor Ruzicska: Malariatherapie im Anfangsstadium der
Paralyse. Orv. Hetil 1930, I.
- Sostakowitch: Konstitution und progr. Paralyse. Sovet. Psichonevr.
8, 1932.
- Sudo Goitiro: Erfahrungen der Malariatherapie während der letzten
7 Jahre. Okayama-Igakkai-Zasshi 43, 1931.
- Swierczek, Stanislaw: Kritische Betrachtungen über Malariatherapie.
Now. Psychiatr. 8, 1931.
- Schroeder-Knud: Weitere Erfahrungen mit Schwefelöl (Sulfofin-)
Behandlung bei Dementia paralytica. Hosp. tid. 1932.
- Schröder, P.: Über Remissionen bei progr. Paralyse. Mfchr. f. Ppsych.
u. Neur. Bd. 32, 1912.
- Schröter, R.: Beitrag zur Behandlung der Dementia paralytica mit
Recurrans Duttoni. Z. Neur. Bd. 103, H, 1/3, 1926.
- Schulze: Die Malariabehandlung der Paralyse. Dtsch. med. Wschr. Jg.
51, Nr. 45, 1925.
- Die wirtschaftlichen Auswirkungn der Malariatherapie bei der
progr. Paralyse. Ppsych. neur. Wschr. Jg. 28, Nr. 30, 1926.
- 5 Jahre Malariatherapie der Metalues. Zfschr. f. ärztl. Fortbil-
dung. Jg. 24, Nr. 24, 1927.
- Schultz, Géza: Die Prognostik d. progr. Paralyse mit besondere Be-
rücksichtigung der Konstitution und des Zustandsbildes. Orv.
Hetil 1932.
- Schuster: 88. Versammlung Dtsch. Naturforscher und Ärzte. Innsbruck,
Sitzg. v. 27. 7. 24. Zbl. 39/25.
- Stanley, Alfred: The present status of 181 cases of general paralysis,
four or more years after treatement with melaria. Psychiatr.
Quart. 6, 1932.
- Steel J. a. E. Nicol: Malariatherapie in general paralysis of the insane.
Lancet. Bd. 212, Nr. 10, 1927.
- Stoddart: Discussion on prognosis and treatement of general paralysis
of the insane. Proc. roy. Soc. Med. 22, 1928.
- Störriing, Ernst: Katamnestische Erhebungen und weitere Ergebnisse
der Malariabehandlung der progr. Paralyse. Arch. f. Ppsych. 91,
1930.
- Thurzo, E. v.: Béla Balla u. A. Koppandy: Über die therapeutischen
Refultate der Infektionsbehandlung der progr. Paralyse vom all-
gemeinen Gesichtspunkt aus und in statist. Beleuchtung. Dtsch.
Zfschr. f. Nervenheilk. 123, 1931.

- Tophoff: Über Remissionen bei der progr. Paralyse. Z. Neur. u. Psych. Bd. 91, 1924.
- Untersteiner, R.: Erfahrungen über die Malariabehandlung der progr. Paralyse. Wien. klin. Wsch. Jg. 37, Nr. 20, 1924.
- Vallejo, Nagera: Die Bewertung der therapeutischen Remissionen der Paralyse. Med. ibera, Bd. 21, Nr. 513, 1927.
- Malariatherapie und Prognose der Paralyse. Zbl. 47, 1927.
- Über Malariabehandlung der progr. Paralyse. Dtsch. med. Wschr. Jg. 54, 1928.
- Vermeylen et P. Vervaeck: Les formes psychosiques chez les paralytiques généraux malarisés et la notion de demence paralytique. Encéphale 25, 1930.
- Villaciau, José M.: Unfere Behandlungsergebnisse bei progr. Paralyse. Archivos Neurobiol. 12, 1932.
- Wagner v. Jauregg: Über die Einwirkung fieberhafter Erkrankungen auf Psychofen. Jahrb. f. Psychiatr. Bd. 7, 1887.
- Malaria und Recurrensbehandlung der progr. Paralyse. Psych. Neur. Wschr. Jg. 27, Nr. 44, 1925.
- Die Impfmalaria an der Wiener psychiatr. Klinik. Wien. Klin. Wschr. Jg. 40, Nr. 36, 1927.
- Die Malariabehandlung der progr. Paralyse, Wien. med. Wschr. Jg. 78, Nr. 1, 1928.
- Paralysefrequenz in und außer d. Irrenanstalt unter dem Einfluß der Malariabehandlung. Mtschr. f. Psychiatr. u. Neur. Bd. 68, 1928.
- Über die Infektionstherapie der progr. Paralyse. Münch. klin. Wschr. 1931, I.
- Bemerkungen zur Behandlung der progr. Paralyse. Wien. med. Wschr. 1933, I.
- Warner, George: A second report on malarial therapy in general paresis. Psych. Quart. 3, 1929.
- Weichbrodt: 88. Versammlung dtsh. Naturforscher u. Ärzte, Innsbruck. Sitzg. v. 27. 9. 24, Zbl. 39, 1925.
- Westphal, A. u. Back: Vorläufige Mitteilung über die ersten hundert mit Malaria behandelten Fälle v. progr. Paralyse. Dermatol. Zschr. Bd. 53, 1928.
- Westrienen, A. van: Ein Fall von juveniler Paralyse mit Malariabehandlung. Nederl. Mtschr. f. Geneesk. 16, 1930.
- Weygandt, W.: Zur Malariabehandlung der Paralyse. Zbl. 33, 1923.
- Über Malariaimpfbehandlung der Paralyse. Klin. Wschr. Jg. 2, Nr. 47, 1923.

- Der Kampf gegen die Paralyse. Ver. südwestdtsh. Neurol. u. Irrenärzte. Baden-Baden, Sitzg. v. 6. u. 7. 6. 25. Zbl. 41, 1925:
 - Erfolge und Bedenken bei der Malariabehandlung der progr. Paralyse. Therapie d. Gegenwart. Jg. 67, H. 2, 1926.
- White, William A.: The malarial therapy of paresis. Intern. Clin. 3, Ser. 41 u. 4 Ser. 41, 1932.
- Wiefel, Fritz: Über Remissionen bei Dementia Paralytica vor der modernen Infektionsbehandlung. Hygiea Bd. 88, H. 21, 1926.
modernen Infektionsbehandlung. Hygiene Bd. 88, H. 21, 1926.
- Williford, L. E.: Treatment of paresis by malaria, sodaku and trypaosamid. Med. clin of North America. Bd. 11, Nr. 5, 1928.
- Worster-Drought and H. Beccle: The treatment of general paralysis of the insane by malarial infection. Brit. med. journ. Nr. 3287, 1923.
- Yorke, W.: An adress ou the malarie treatement of general paralysis of the insane. Lancet, Br. 210, Nr. 9, 1926
- Ziegelroth, L.: Fünf Jahre Pyrifertherapie. Zbl. 72, H. 7/8, 1934.
-

Lebenslauf.

Als Sohn des Müllermeisters Michel Luy und seiner Frau Anna Maria, geb. Piry, wurde ich, Hans Josef Luy am 29. 10. 1909 in Oberremmel an der Saar geboren. Ich besuchte die höhere Knabenschule in Heinsberg bei Aachen und das Friedrich-Wilhelms-Gymnasium in Trier. Die fünf vorklinischen Semester studierte ich in Bonn, wo ich auch meine ärztliche Vorprüfung bestand. Von den klinischen Semestern studierte ich zwei in München, eins in Wien, eins in Graz und zwei in Bonn. Mein ärztliches Staatsexamen bestand ich in Bonn im Januar 1934.

Als Medizinalpraktikant war ich acht Monate in der Dr. Hertz'schen Privatklinik in Bonn, vier Monate auf der Inneren Abteilung der Marienhospitals Bonn. Vom 1. Februar 1935 an war ich als zweiter Assistent auf der chirurgischen Abteilung des Marienhospitals Bonn (Prof. Els) bis 1. August 1936 tätig. Ab 1. Oktober bin ich als planmäßiger erster Assistent der chirurgischen Abteilung des Herz-Jesu-Krankenhauses in Trier beschäftigt.
